

3 1761 07550420 9

M FERNRHR

*EINE SAMMLUNG
VON BEOBACHTUNGSOBJEKTEN FÜR
FREUNDE DES GESTIRNTEN HIMMELS*

VON

FRIEDRICH BECKER



UNIVERSITY
OF
TORONTO
LIBRARY

BERLIN UND BONN

FERD. DÜMLERS VERLAGSBUCHHANDLUNG

1924



12. P. 12
513700

DRUCK VON OSCAR BRANDSTETTER IN LEIPZIG.

Germany

Vorwort.

Es mag nicht wenige Freunde des gestirnten Himmels geben, die zwar in der populären Literatur gut belesen sind, auch über ein brauchbares Instrument, sei es einen Feldstecher, sei es ein Fernrohr, verfügen, trotzdem aber nicht zum selbständigen Beobachten kommen, weil die Beschaffung der notwendigen literarischen Hilfsmittel auf Schwierigkeiten stößt. Besitzer eines Opernglases oder eines 2- bis 3-Zöllers werden selten geneigt oder in der Lage sein, sich die großen Kataloge der Veränderlichen und Doppelsterne, die *Harvard-Annalen* oder die *Bonner Durchmusterung* anzuschaffen, ganz abgesehen davon, daß diese Werke z. T. überhaupt nicht jedermann zugänglich sind. Für solche Verhältnisse ist das vorliegende Büchlein bestimmt, das, nach den neuesten Quellen bearbeitet, eine Auswahl von Beobachtungsobjekten aus der Fixsternwelt darbietet. Zugleich ist es als Ergänzung gedacht zu dem vom Verfasser neu herausgegebenen *Littrowschen Sternatlas* und zum *Hevelius, Handbuch für Freunde der Astronomie und kosmischen Physik* (beide vor kurzem im *Dümmlerschen* Verlage erschienen). Mit Rücksicht auf das letztgenannte Buch konnte im vorliegenden die Anleitung zum Beobachten auf ein Mindestmaß beschränkt werden.

Meinen aufrichtigen Dank möchte ich Herrn Professor Dr. *J. Plassmann* in Münster aussprechen, der mir bereitwilligst die Benutzung seiner eigenen Fachbibliothek und derjenigen der Universitäts-Sternwarte in Münster gestattete.

Münster 1923.

Friedrich Becker.

Inhaltsverzeichnis.

I. Helligkeiten, Farben und Spektra der Sterne 1. bis 3. Größe	5
II. Doppel- und mehrfache Sterne	10
III. Sternhaufen und Nebel	46
IV. Veränderliche Sterne	53
V. Hilfstafeln	81



I.

Helligkeiten. Farben und Spektren der Sterne 1. bis 3. Größe.

Das nachstehende Verzeichnis gibt für die in Mitteleuropa sichtbaren, helleren Sterne zunächst die Größenklassen nach den beiden wichtigsten photometrischen Katalogen, der *Potsdamer Durchmusterung* (*P. D.*) und der *Revised Harvard Photometry* (*R. H. P.*). Man kann diese Angaben z. B. dazu benutzen, sich im Schätzen kleiner Helligkeitsunterschiede nach *Argelanders* Methode zu üben. Hierzu eignen sich besonders Sternbilder mit mehreren nahezu gleich hellen Sternen wie Andromeda, Löwe, Orion, Perseus und großer Bär. Man wähle sich vollkommen klare, mondscheinlose Nächte aus und einen Standort, der von irdischen Beleuchtungsanlagen möglichst fern liegt, und versuche dann, ohne vorher Einsicht in das Verzeichnis zu nehmen, die Sterne nach abnehmender Helligkeit zu ordnen, ein Verfahren, das man so lange wiederholt, bis man die Überzeugung gewonnen hat, daß das Ergebnis durch weitere Schätzungen nicht mehr zu verbessern sei. Man wird z. B. den Unterschied zwischen zwei Sternen, die erst nach längerem Ansehen mit Sicherheit geordnet werden können, mit 2 Stufen bezeichnen, solche, die auf den ersten Blick ungleich hell erscheinen, sind um wenigstens 3 Stufen verschieden, während für Sterne, bei denen sich die Reihenfolge nur mit Wahrscheinlichkeit herstellen läßt, 1 Stufe als Unterschied anzusetzen wäre¹⁾. Erst nach Abschluß der Beobachtung prüfe man an Hand der Tabelle die erzielte Genauigkeit. Zur Orientierung sei bemerkt, daß geübte Beobachter im Durchschnitt eine Helligkeitsdifferenz von 0,07 Größenklassen als eine Stufe auffassen. Der Unterschied zwischen den zu vergleichenden Sternen darf dann allerdings

¹⁾ Nähere Anweisungen betreffs der *Argelanderschen* Stufenmethode gibt u. a. das im Vorwort genannte *Hévelius-Werk*.

0,4 bis 0,5 Größenklassen nicht übersteigen, andernfalls treten gewisse, physiologisch begründete Schätzungsfehler auf, die einen weit größeren Stufenwert zur Folge haben.

Die Sternfarbe gibt unsere Zusammenstellung ebenfalls nach zwei Quellen, nämlich nach dem Katalog von *Osthoff* (*Specola Vaticana VIII*) und nach der *Potsdamer Durchmusterung*. Die Symbole der letzteren sind die Anfangsbuchstaben der Farben Weiß, Gelb, Rot, Gelbweiß, Weißgelb usw.; feinere Unterschiede werden durch Benutzung von Plus- oder Minuszeichen angedeutet. Dagegen bezeichnet *Osthoff* die Farben durch Zahlen, wobei er folgende Skala benutzt:

- 0 Weiß,
- 1 Gelblichweiß (W überwiegt),
- 2 Weißgelb (W und G zu gleichen Teilen),
- 3 Hellgelb oder Bläßgelb,
- 4 Reingelb,
- 5 Dunkelgelb,
- 6 Rötlichgelb,
- 7 Orange,
- 8 Gelblichrot,
- 9 Rot.

Die in unserem Verzeichnis mitgeteilten Zahlen sind natürlich Mittelwerte aus mehreren, z. T. sogar sehr vielen Einzelschätzungen.




Fig. 1. Schematische Darstellung der Spektralklassen

Der Gebrauch eines Fernrohres oder auch nur eines Opernglases erleichtert das Farbenschätzen; man benutze nach Möglichkeit immer ein und dasselbe Instrument; Beobachtungen, die mit verschiedenen Instrumenten erhalten sind, dürfen nicht ohne weiteres vermischt werden.

Für Besitzer eines Sternspektroskopes ist die letzte Spalte bestimmt, die den Spektraltypus der Sterne nach dem *Harvard*-System angibt. Die nebenstehende schematische Zeichnung (Fig. 1) gibt den Charakter der sechs Grundklassen B, A, F, G, K, M ungefähr so wieder, wie er sich

in einem kleinen Okularspektroskop darstellt¹⁾. In dem obersten der sieben Rechtecke sind die Grenzen der Farbengebiete Rot, Orange, Gelb, Grün, Blau und Violett angedeutet, ferner ist der Maßstab der Wellenlängen in milliontel Millimetern ($\mu\mu$ = Millimikron) beigeschrieben. — In Klasse *B* treten besonders die Heliumlinien hervor, für Klasse *A* ist die Serie der nach Violett zu immer dichter zusammenrückenden Wasserstofflinien charakteristisch. Klasse *F* bildet den Übergang zu *G* (Sonne), wo namentlich die Metalllinien zahlreich und kräftig sind, während *K* und noch mehr *M* durch breite dunkle Bänder im Gelb, Grün und Blau ausgezeichnet ist²⁾. Interessante und lehrreiche Beobachtungen lassen sich über die wechselnde Breite und Intensität der Linien bei Sternen derselben oder verschiedener Klassen anstellen; so wird man z. B. finden, daß die Wasserstofflinien mit fortschreitendem Typus immer schwächer werden, während gleichzeitig die beiden Kalziumlinien im äußersten Violett immer stärker hervortreten; man vergleiche ferner einmal die Breite der Linien in den sonst ganz gleichartigen Spektren von *α Aquilae* und *α Lyrae*. Schließlich gibt auch die wechselnde Intensität des farbigen Untergrundes der Spektre zu mannigfachen Beobachtungen Anlaß.

Positionen sind in dieser Tabelle nicht enthalten, weil es sich um lauter helle Sterne handelt, die man auch ohne dieses Hilfsmittel im Atlas leicht findet.

¹⁾ Das wirkliche Spektrum erscheint allerdings nie so scharf und klar, wie es die Zeichnung glauben machen könnte. Es ist vielmehr ein verwaschenes, oft unruhig flackerndes Band, in dem der weniger Geübte meist ziemlich lange suchen muß, um eine Linie oder auch nur die Andeutung einer Linie zu finden.

²⁾ Die beigeschriebenen Zahlen bedeuten Übergangsstufen zwischen den einzelnen Klassen, die kleinen Buchstaben Unterabteilungen.

Sternbild	★	P.D.	R.H.P.	Farbe O.	Farbe P.D.	Spektral- typus
Andromeda		m	m			
	α	2,42	2,15	1,8	W	A0p
	β	2,32	2,37	6,4	RG—	Ma
Aquila	γ	2,35	2,20	5,3	RG—	K0
	α	1,12	0,89	2,6	GW—	A5
	γ	3,08	2,80	6,3	G—	K2
Aries	α	2,19	2,23	5,5	WG	K2
	β	3,02	2,72	2,7	GW—	A5
Auriga	α	0,43	0,21	3,2	WG—	G0
	β	2,21	2,07	1,7	W+	A0p
	ι	2,84	2,90	6,3	RG	K2
Bootes	δ	2,87	2,71	1,8	W+	A0p
	α	0,24	0,24	4,6	WG	K
	γ	3,34	3,00	2,5	W+	F
	ε	2,66	2,70	4,8	WG	K
Canis major	η	3,08	2,80	3,9	GW	G
	α		—1,58	0,6		A0
	β		1,99	1,9		B1
	δ		1,98			F8p
	ε		1,63			B1
Canis minor Cassiopeia	η		2,43			B5p
	α	0,72	0,48	2,4	GW—	F5
	α	var.	var.	5,3		K0
	β	2,56	2,42	3,1	GW	F5
	γ	2,46	2,25	2,1	W+	B0p
Cepheus	δ	2,96	2,80	3,0	W+	A5
	α	2,78	2,60	3,0	GW—	A5
	α	2,89	2,82	6,5	G—	Ma
Cetus	β		2,24	5,9		K0
	α	2,58	2,31	2,3	W	A
Corona bor.						
Corvus	β		2,84	5,9		G5
	γ		2,78	3,1		B8
	δ		3,11	3,5		A
Cygnus	α	1,59	1,33	2,1	W	A2
	γ	2,48	2,32	4,1	WG	F8p
	δ	3,18	2,97	2,6	GW—	A
	ε	2,72	2,64	5,5	G	K
Draco	β	3,01	2,99	5,1	WG	G
	γ	2,47	2,42	6,4	RG—	K5
	η	2,99	2,89	4,9	G—	G5
Eridanus	β		2,92	3,2		A3
Gemini	α	1,94	1,99	1,8	GW—	A0
	β	1,51	1,21	4,2	WG+	K0
	γ	2,34	1,93	1,8	GW—	A0
Hercules	α	var.	var.	6,6		Mb
	β	3,01	2,81	5,0	WG+	K
	ζ	3,16	3,00	4,3	WG—	G
Hydra	α		2,16	6,0		K2
Leo major	α	1,73	1,34	1,4	GW—	B8
	β	2,62	2,23	2,5	GW—	A2

Sternbild	★	P.D.	R.H.P.	Farbe O.	Farbe P.D.	Spektral- typus
Leo major	δ	m 2,92	m 2,58	2,8	GW	A2
	γ	2,43	2,61	5,0	RG—	K
Lepus	α		2,69	3,0		F0
Libra	α		2,90	3,3		A2
	β		2,74	2,4		B8
Lyra	α	0,38	0,14	1,2	W	A
Ophiuchus	α	2,54	2,14	2,7	GW—	A5
	β	3,06	2,94	5,4	G—	K
	δ		3,03	6,7		Ma
	η		2,63	4,0		A
Orion	ζ		2,70	2,8		B
	α	var.	var.	6,3		Ma
	β		0,34	0,9		B8p
	γ	2,06	1,70	1,3	GW—	B2
	δ		2,48	1,9		B0
	ϵ		1,75	1,8		B0
	ζ		2,05	1,8		B0
	ι		2,87	3,0		Oe5
Pegasus	κ		2,20	2,7		B0
	α	3,20	2,57	2,4	GW—	A
	β	var.	var.	6,6		Mb
	γ	3,28	2,87	2,1	GW—	B2
Perseus	ϵ	2,76	2,54	6,4	G—	K
	α	2,16	1,90	3,5	GW+	F5
	β	var.	var.	1,9		B8
	ϵ	3,14	2,96	2,2	W	B1
Sagittarius	ζ	3,13	2,91	3,1	GW+	B1
	δ		2,84			K
	λ		2,94			K
	σ		2,14			B3
Scorpius	α		1,22	8,0		Map
	β		2,90			B1
	δ		2,54			B
	τ		2,91			B
Serpens	α	2,88	2,75	5,5	G—	K
Taurus	α	1,15	1,06	6,1	G+	K5
	β	2,01	1,78	1,1	W+	B8
	ζ	3,29	3,00	1,6	GW—	B3p
	η	3,09	2,96	3,2	W	A0
Ursa major	α	2,04	1,95	4,9	WG+	K
	β	2,63	2,44	1,8	W	A
	γ	2,68	2,54	1,8	W+	A
	ϵ	2,16	1,68	1,7	W	Ap
	ζ	2,38	2,40	1,9	GW—	Ap
	η	2,26	1,91	1,5	W	B3
Ursa minor	α	2,31	2,12	3,9	GW+	F8
	β	2,26	2,24	6,3	G+	K5
Virgo	α		1,21	1,5		B2
	ϵ	3,11	2,95	4,9	WG	K



II.

Doppel- und mehrfache Sterne.

Unter den Tausenden von Doppel- und mehrfachen Sternen gibt es eine große Zahl, die auch mit kleineren Instrumenten beobachtet werden können, sei es, daß der Liebhaber ein Mikrometer besitzt, das ihm Distanzen und Positionswinkel zu messen gestattet, sei es, daß er in Ermangelung eines solchen sich darauf beschränkt, die Farben der Komponenten zu bestimmen, oder auch nur die optische Kraft seines Fernrohres zu prüfen. So geben wir denn im folgenden eine nach Sternbildern geordnete Auswahl von Beobachtungsobjekten, die nach dem Generalkatalog von *Burnham* zusammengestellt ist und allen Ansprüchen des Liebhabers genügen dürfte.

Die gegenseitige Stellung der Komponenten eines Doppelsternsystems wird durch die Angabe der scheinbaren Distanz (d) und des Positionswinkels (p) gekennzeichnet, wobei




Fig. 2. Zählung des Positionswinkels. Der Doppelstern *Mizar*, $p = 150^\circ$, $d = 14''$ (Maßstab $2'' = 1\text{ mm}$).

erstere in Bogensekunden, letzterer in Graden ausgedrückt ist. Die Zählung des Positionswinkels veranschaulicht Fig. 2. Bedeutet der innere Kreis das Gesichtsfeld eines umkehrenden Fernrohres, die Nord-Süd-Linie den Stundenkreis, die Ost-West-Linie den Parallel der helleren Komponente A, so zählt man den Positionswinkel von Nord (0°) über Ost (90°), Süd (180°),

West (270°) wieder bis Nord (360° oder 0°). Nehmen wir z. B. den prächtigen Doppelstern *Mizar* im großen Bären ($p = 150^\circ$, $d = 14''$). Wir verbinden zunächst A durch eine gerade Linie mit dem Strich des geteilten Kreisringes, der dem Winkel 150° entspricht, und tragen nun auf dieser Geraden von A aus die Distanz $14''$ in einem beliebigen Maßstabe — etwa $2'' = 1\text{ mm}$ —

ab; der Punkt *B*, zu dem wir so gelangen, gibt uns dann den Ort des Begleiters an. Kennt man den Durchmesser des Gesichtsfeldes im Bogenmaß, so ist es ein leichtes, die Zeichnung auch im richtigen Maßverhältnis auszuführen. Natürlich ist darauf zu achten, daß die gegenseitige Lage der beiden Komponenten *A* und *B* durch die tägliche Bewegung beständig verändert wird. Solange man sich noch nicht daran gewöhnt hat, orientiert man sich hier am besten durch eine einfache Überlegung an Hand der drehbaren Sternkarte.

So wird auch der Anfänger unschwer in der Lage sein, die folgenden Angaben richtig zu verwerten und die Beobachtung der Doppelsterne nach Maßgabe seiner Mittel in sein Arbeitsprogramm einzubeziehen. Freilich darf man nicht von vorneherein zu hoch gespannte Erwartungen hegen; wie man anfangs kaum eine Linie im Sternspektrum erkennt, so wird man zunächst auch manchen Doppelstern nicht trennen, den das benutzte Instrument theoretisch noch zeigen müßte. Hier wie dort macht eben die Übung vieles.

Im folgenden ist jedem Stern ein kurzer Textabschnitt gewidmet, der alle Angaben enthält, die für den Beobachter von Interesse sind. In der Überschrift steht jeweils die Bezeichnung des Sternes nach *Bayer* oder *Flamsteed*, seine Position für 1900 und seine Nummer im *Burnhamschen* Generalkatalog. Der Text gibt zunächst die Helligkeiten und Farben der einzelnen Komponenten, dann eine kurze Charakterisierung des Systems und endlich die neuesten, von *Burnham* angeführten Messungen des Positionswinkels und der Distanz nebst Angabe des Jahres, für das die Messung gilt. Sind mehr als zwei Komponenten vorhanden, so werden zu ihrer Unterscheidung große lateinische Buchstaben benutzt.

Einer kurzen Erläuterung bedürfen vielleicht die bei der Charakterisierung der einzelnen Objekte benutzten Ausdrücke. Physische Systeme sind solche, deren Komponenten sich durch Umlaufsbewegung um einen gemeinsamen Schwerpunkt als tatsächlich zusammengehörig kennzeichnen; zu dieser Gruppe sind im allgemeinen auch diejenigen Systeme zu rechnen, deren Komponenten zwar keine Bahnbewegung erkennen lassen, ihre Zusammengehörigkeit aber durch gemeinsame Eigenbewegung im Raum verraten. In solchen Fällen ist entweder die Um-

laufszeit oder die Entfernung des Systems so groß, daß es jahrhundertelanger Messungen bedarf, um eine gegenseitige Verschiebung der Komponenten im Sinne einer Bahnbewegung nachzuweisen. Demgegenüber sind die Komponenten eines optischen Systems nicht selten in rascher gegenseitiger Ortsveränderung begriffen, die aber nicht auf Umlaufsbewegung beruht, sondern lediglich auf dem Umstande, daß diese Komponenten, die in Wahrheit nichts miteinander zu tun haben, sich in ganz verschiedenen Richtungen durch den Raum bewegen. Wir sehen diese Sterne zwar in nahe der gleichen Richtung und scheinbar dicht nebeneinander, in Wirklichkeit steht aber der eine weit hinter dem anderen.

1. Andromeda.

α ($23^h 35^m + 43^\circ 47'$) 12497.

Dreifaches System. $A=4.$, $B=11.0.$ und $C=11.0.$ Gr.

AB 1901: $p=191^{\circ}.7$, $d=46''.8$.

AC 1901: $p=294^{\circ}.6$, $d=105''.0$.

μ ($0^h 3^m + 28^\circ 32'$) 19.

Optisches System. Hauptstern 2.0. Gr. Begleiter 11.2. Gr. 1903: $p=275^{\circ}.2$, $d=73''.9$.

26 ($0^h 3^m + 43^\circ 14'$) 181.

Wahrscheinlich ein physisches System. Hauptstern 6.5. Gr., Begleiter 10.2. Gr. 1898: $p=240^{\circ}.9$, $d=6''.2$.

π ($0^h 32^m + 33^\circ 10'$) 329.

Hauptstern 4.2. Gr., Begleiter 9.0. Gr. 1903: $p=173^{\circ}.0$, $d=36''.1$.

36 ($0^h 50^m + 23^\circ 5'$) 482.

Ein physisches System. Aus den Messungen der letzten 50 Jahre folgt nach *Burnham* eine Periode von 140 Jahren. Der Hauptstern ist 6.2. Gr. und goldfarben, der Begleiter 6.8. Gr. 1902: $p=22^{\circ}.7$, $d=1''.0$.

μ ($0^h 51^m + 37^\circ 57'$) 497.

Ein dreifaches System. A ist 4., B 13. und C 11.5. Gr.

AB 1901: $p=311^{\circ}.1$, $d=39''.7$.

AC 1901: $p=122^{\circ}.2$, $d=36''.9$.

β ($1^h 4^m + 35^\circ 5'$) 605.

Acht Sternchen 10. bis 14. Gr. stehen im Umkreis von $5'$ um den Hauptstern. Die Gruppe ist von *Burnham* vermessen worden.

ω ($1^h 22^m + 44^\circ 53'$) 758.

Vierfach. A ist 5.3., B 12., C 10.7., D 10.7. Gr., A und B bilden anscheinend ein physisches System.

1902: AB $p=96^{\circ}.0$, $d=2''.6$.

1902: AC $p=110^{\circ}.5$, $d=126''.9$.

1898: CD $p=136^{\circ}.8$, $d=5''.3$.

τ ($1^h 35^m + 40^\circ 4'$) 861.

Hauptstern 5.0., Begleiter 10.2. Gr. 1900: $p=329^{\circ}.0$, $d=52''.6$.

56 ($1^h 50^m + 36^\circ 46'$) 1008.

Ein weites Paar; beide Sterne sind 6. Gr. und weiß. 1903: $p=300^{\circ}.3$, $d=187''.4$. *Burnham* ent-

deckte 1903 noch einen Stern 11,4. Gr. näher bei A. seine Messungen ergaben $p = 79^{\circ}.6$, $d = 18''.4$.

γ ($1^h 58^m + 41^{\circ} 51'$) 1070.

Ein ausgezeichnetes Paar! Der Hauptstern 3. Gr. ist goldgelb und hat einen blauen Begleiter 5. Gr. Positionswinkel und Distanz seit 1830 unverändert. 1878: $p = 64^{\circ}.3$, $d = 10''.7$.

Im Jahre 1842 fand *Otto Struve* den Begleiter doppelt. Die seitherigen Messungen lassen ihn als

physisches System erkennen mit einer Umlaufszeit von rund 55 Jahren. Die Übereinstimmung der einzelnen Messungen mit der angenommenen Bahn ist aber wenig befriedigend. Der Begleiter ist 6,2. Gr. 1903: $p = 113^{\circ}.8$, $d = 0''.5$.

59 ($2^h 5^m + 38^{\circ} 34'$) 1125.

Optisch. Die beiden Komponenten sind 6,7. und 7,2. Gr. und sehr weiß. *Burnham* fand 1904: $p = 35^{\circ}.0$, $d = 16''.6$.

2. Aquarius. (Der Wassermann.)

7 ($20^h 51^m - 10^{\circ} 5'$) 10616.

Sehr wahrscheinlich ein physisches System. Der Hauptstern ist 6,0., der Begleiter 11,7. Gr. 1901: $p = 166^{\circ}.2$, $d = 2''.1$.

12 ($20^h 59^m - 6^{\circ} 13'$) 10698.

Ein hübsches Paar. Der gelbliche Hauptstern ist 5,6., der blaue Begleiter 7,7. Gr. 1903: $p = 191^{\circ}.1$, $d = 2''.8$.

51 ($22^h 19^m - 5^{\circ} 21'$) 11691.

Ein physisches System. Die Distanz ist in langsamer Zunahme begriffen. Beide Sterne 6,9. Gr. 1903: $p = 2^{\circ}.3$, $d = 0''.7$. In der Nähe stehen drei weitere Sterne 9., 10. und 11. Gr., die jedoch von geringem Interesse sind.

53 ($22^h 21^m - 17^{\circ} 15'$) 11715.

Ein physisches System. Der Hauptstern ist 6., der Begleiter 6,5. Gr. Letzte Messung 1903: $p = 309^{\circ}.2$, $d = 6''.7$.

ζ ($22^h 24^m - 0^{\circ} 32'$) 11743.

Physischer Doppelstern mit großer Umlaufszeit. Hübsches Paar für kleinere Instrumente. Haupt-

stern 4,0. Gr. und grünlich-weiß. Begleiter 4,1. Gr. *Burnham* maß 1905: $p = 317^{\circ}.0$, $d = 2''.9$.

τ^1 ($22^h 42^m - 14^{\circ} 35'$) 11967.

Der gelbe Hauptstern 6,0. Gr. hat einen Begleiter 9,2. Gr. *Burnham* gibt 1905: $p = 116^{\circ}.8$, $d = 26''.3$.

83/84 ($23^h 0^m - 8^{\circ} 14'$) 12143.

Diese beiden Sterne bilden ein weites Paar; der eine ist 5,6., der andere 7,0. Gr. 1891 war $p = 147^{\circ}.3$, $d = 258''.9$.

η^1 ($23^h 11^m - 9^{\circ} 38'$) 12257.

Ein physisches System. Der gelbe Hauptstern 4,5. Gr. hat einen blauen Begleiter 8,5. Gr., der von *Burnham* selbst wieder als doppelt erkannt wurde. *Burnham* fand 1903: $p = 311^{\circ}.7$, $d = 49''.4$.

94 ($23^h 14^m - 14^{\circ} 0'$) 12292.

Schönes Paar. Ein gelblich-weißer Stern 5. und ein blauer Stern 7. Gr. 1902: $p = 347^{\circ}.5$, $d = 13''.4$.

104 ($23^h 37^m - 18^{\circ} 22'$) 12511.

Die Sterne sind 5,5. und 7. Gr. Messungen *Burnhams* ergaben 1905: $p = 5^{\circ}.7$, $d = 122''.2$.

3. Aquila. (Der Adler.)

2 ($18^h 37^m - 9^0 9'$) 8725.

Hauptstern 5,5., Begleiter 10. Gr. *Burnham* gibt für 1905: $d = 130^0.6$, $d = 52''.6$.

5 ($18^h 41^m - 1^0 4'$) 8779.

Dreifach. *A* 5,6. Gr. weiß, *B* 7,4. Gr. bläulich, *C* 11,2. Gr. *AB* 1903: $p = 121^0.0$, $d = 12''.9$. *AC* 1880: $p = 145.5$, $d = 27.5$.

11 ($18^h 54^m + 13^0 29'$) 8940.

Hauptstern 5,7. Gr. grünlich-weiß, Begleiter 9,2. Gr. grau. 1831: $p = 241^0.6$, $d = 18''.7$.

15 ($19^h 0^m - 4^0 11'$) 9005.

Ein weißer Stern 6. Gr. mit einem bläulichen Begleiter 7. Gr. *Burnham* 1900: $p = 208^0.3$, $d = 37''.2$.

23 ($19^h 13^m + 0^0 54'$) 9189.

Optisches System. Der gelbe Hauptstern ist 5,5., der blaue Begleiter 9,5. Gr. *Burnham* 1905: $p = 9^0.5$, $d = 3''.0$.

24 ($19^h 14^m + 0^0 9'$) 9195.

Zwei Sterne 6. Gr., der eine weiß,

der andere gelb. 1894: $p = 316^0.0$, $d = 423''.4$. Ohne Änderung.

28 ($19^h 15^m + 12^0 11'$) 9207.

Ein Stern 6. Gr. mit einem blauen Begleiter 9. Gr. 1904: $p = 175^0.5$, $d = 60''.1$. Ohne Änderung.

π ($19^h 44^m + 11^0 34'$) 9634.

Zwei gelbliche Sterne 6,0. und 6,8. Gr. 1897: $p = 117^0.2$, $d = 1''.4$. Ohne Änderung.

α ($19^h 46^m + 8^0 36'$) 9657.

Dieser helle Stern hat einen Begleiter 10,2. Gr. *Burnham* gibt 1905: $p = 305^0.7$, $d = 161''.3$. Infolge der Eigenbewegung des hellen Sternes nimmt die Distanz langsam zu.

56 ($19^h 49^m - 8^0 50'$) 9697.

Hauptstern 6. Gr. gelb, Begleiter 11. Gr. blau. *Burnham* 1901: $p = 76^0.4$, $d = 46''.4$. Unveränderlich.

57 ($19^h 49^m - 8^0 29'$) 9707.

Hauptstern 5,2., Begleiter 6,2. Gr., beide sehr weiß. 1903: $p = 171^0.0$, $d = 35''.7$.

4. Argo Navis. (Das Schiff Argo.)

α ($7^h 35^m - 26^0 34'$) 4197.

Zwei Sterne 4. Gr., die anscheinend nur ein optisches Paar bilden.

1898: $p = 318^0.1$, $d = 9''.7$.

5. Aries. (Der Widder.)

1 ($1^h 45^m + 21^0 47'$) 963.

Ein optisches Paar. Die beiden Sterne sind 6,2. und 7,4. Gr. Der hellere ist goldgelb, der schwächere tiefblau. 1896: $p = 165^0.8$, $d = 2''.9$.

γ ($1^h 48^m + 18^0 48'$) 993.

Ein sehr schönes Paar! Die beiden Sterne sind 4. Gr. und sehr

weiß. Da die beiden Komponenten gemeinsame Eigenbewegung haben, ist das System wahrscheinlich physisch. Die Umlaufszeit muß sehr groß sein, da Distanz und Positionswinkel bisher absolut unverändert geblieben sind. *Doolittle* findet 1901: $p = 359^0.4$, $d = 8''.0$. In $d = 222''.8$ noch ein Stern 9. Gr., den *Burnham* als engen und

sehr schwierigen Doppelstern erkannte.

λ ($1^h 52^m + 23^0 7'$) 1028.

Der Hauptstern 4,9. Gr. hat einen Begleiter 7,7. Gr. Die gegenseitige Lage der beiden Komponenten ändert sich anscheinend nicht. *Franz* findet 1891: $p = 46^0.5$, $d = 37''.5$.

10 ($1^h 58^m + 25^0 27'$) 1074.

Bei der Entdeckung in mittleren Instrumenten noch gut trennbar, sind die beiden Komponenten des anscheinend physischen Paares heute sehr eng zusammengedrückt. 1902: $p = 72^0.4$, $d = 0''.6$. Hauptstern 6. Gr. gelb, Begleiter 8,4. Gr. grau.

14 ($2^h 4^m + 25^0 28'$) 1116.

Dreifach. A 5,2., B 8,5., C 7,7. Gr. *Burnham* findet:

1904: AB $p = 36^0.7$, $d = 93''.3$.

1904: AC $p = 278.3$, $d = 105.7$.

30 ($2^h 31^m + 24^0 13'$) 1332.

Der gelbe Hauptstern ist 6., der weiße Begleiter 7. Gr. Distanz und

Positionswinkel ändern sich nicht. *Burnham* gibt für 1904: $p = 274^0$, $d = 38''.4$.

33 ($2^h 35^m + 26^0 38'$) 1364.

Der gelbliche Hauptstern 6. Gr. hat einen Begleiter 8,7. Gr. Die beiden Sterne haben gemeinsame Eigenbewegung, ihre gegenseitige Stellung ändert sich nicht. *Burnham* gibt für 1904: $p = 360^0.1$, $d = 28''.6$.

π ($2^h 44^m + 17^0 3'$) 1448.

Dreifach. Der gelbe Hauptstern ist 4,9., B 8,4., C 10,2. Gr. Eine Änderung der gegenseitigen Lage der drei Sterne ist nicht nachzuweisen. Für AB gibt *Doolittle* 1902: $p = 120^0.7$, $d = 3''.0$. AC nach *Struve* 1832: $p = 110^0.1$, $d = 25''.2$.

ε ($2^h 53^m + 20^0 56'$) 1512.

Ein physisches System mit langgestreckter Bahn. Die Distanz nimmt gegenwärtig ab. Der Hauptstern ist 5,7., der Begleiter 6. Gr., beide weiß. 1902: $p = 203^0.0$, $d = 1''.2$.

6. Auriga. (Der Fuhrmann.)

ω ($4^h 52^m + 37^0 44'$) 2435.

Ein grünlicher Stern 4. Gr. mit einem blauweißen Begleiter 7,9. Gr. Der Begleiter hat dieselbe Bewegung wie der Hauptstern, seine Stellung zu ihm ist fest. 1889: $p = 352^0.8$, $d = 6''.0$.

5 ($4^h 53^m + 39^0 15'$) 2445.

Nach *Burnham* wahrscheinlich ein physisches Paar, obwohl die bisherigen Messungen wenig Anhalt dafür bieten. Der Hauptstern 6., der Begleiter 9,7. Gr. *Lewis* findet 1903: $p = 253^0.0$, $d = 3''.0$.

9 ($4^h 59^m + 51^0 28'$) 2495.

Hauptstern 5,5., Begleiter 9. Gr. Nach *Burnham* gilt für 1898: $p = 60^0.9$, $d = 89''.8$. Einen Stern 13. Gr. fand *Burnham* in $d = 6''$ vom Hauptstern.

14 ($5^h 9^m + 32^0 34'$) 2591.

Ein schönes Paar für kleinere Fernrohre. Der grüne Hauptstern ist 5. Gr., der bläulich-weiße Begleiter 7,2. Gr. Die bisherigen Messungen lassen keine Lagenänderung erkennen. 1893: $p = 224^0.7$, $d = 14''.3$. Etwas näher beim Hauptstern ein weiterer Begleiter 11. Gr.

α ($5^h 9^m + 45^\circ 54'$) 2597.

Rings um Capella stehen mehrere schwache Sternchen, der hellste von ihnen in einer Distanz $7\frac{1}{2}'$ ist 9. Gr.

λ ($5^h 12^m + 40^\circ 1'$) 2627.

Zwei Sterne, die nur optisch zusammengehören. Der gelbe Hauptstern ist 5,2., der schwächere 8,7. Gr. 1900: $p = 70.2$, $d = 133''.5$. Näher beim Hauptstern noch zwei Objekte 12. und 13. Gr.

26 ($5^h 32^m + 30^\circ 31'$) 2857.

Hauptstern 5,8., Begleiter 8,0. Gr. Ersterer von *Burnham* wiederum als doppelt erkannt ($d = 0''.2$). 1903: $p = 267.6$, $d = 12''.4$. Außerdem ein Stern 11. Gr. in $d = 33''.1$.

ν ($5^h 45^m + 39^\circ 7'$) 2996.

Ein Stern 4. Gr. mit einem Begleiter 9,5. Gr. 1898: $p = 206.7$, $d = 55''.2$.

β ($5^h 52^m + 44^\circ 56'$) 3064.

Dieser Stern hat einen Begleiter 10. Gr. in $184''$ Distanz; $p = 39.3$ nach *Burnham*.

θ ($5^h 53^m + 37^\circ 12'$) 3074.

Hauptstern lichtgrün, 3. Gr. Zwei Begleiter *B* 7,5. Gr. blau. *D* 9. Gr.

A und *B* haben gemeinsame Eigenbewegung, doch stimmen die verschiedenen Messungen von Distanz und Positionswinkel schlecht zusammen.

1899: AB $p = 346.7$, $d = 2''.5$.

1890: AD $p = 349.6$, $d = 127.4$.

41 ($6^h 4^m + 48^\circ 44'$) 3181.

Ein Sternpaar mit gemeinsamer Raumbewegung und fester, gegenseitiger Stellung. Der hellere Stern ist 5,2., der schwächere 6,4. Gr., beide sehr weiß. Für 1897 gelten folgende Messungen: $p = 355.2$, $d = 7''.6$.

54 ($6^h 33^m + 28^\circ 21'$) 3518.

Ein enges Paar mit gemeinsamer Raumbewegung ohne Änderung von p und d . Der bläulich-weiße Hauptstern ist 6,0., der weiße Begleiter 7,8. Gr. 1903: $p = 37.6$, $d = 0''.8$.

56 ($6^h 40^m + 43^\circ 41'$) 3585.

Zwei Sterne 6. und 9. Gr., die ein optisches Paar bilden; der helle Stern ist weiß, der schwache blau. 1900: $p = 24.6$, $d = 45''.4$. Die Änderung dieser Größen rührt von der Eigenbewegung der helleren Komponente her.

7. Bootes.

1 ($13^h 36^m + 20^\circ 28'$) 6586.

Ein Stern 6,2. Gr. mit einem Begleiter 9,1. Gr.; der hellere bläulich-weiß, der schwächere tiefblau. Distanz und Positionswinkel nahezu konstant. 1903: $p = 141.2$, $d = 4''.8$.

13 ($14^h 5^m + 49^\circ 56'$) 6736.

Hauptstern 5., Begleiter 9. Gr. 1902: $p = 274.3$, $d = 81''.1$.

$\times$ ($14^h 10^m + 52^\circ 15'$) 6778.

Schönes Paar. Grüner Hauptstern 5. Gr. mit einem blauen Begleiter 7. Gr. Gemeinsame Eigenbewegung beider Komponenten, aber keine gegenseitige Verschiebung. 1902: $p = 236.9$, $d = 13''.2$.

ϵ ($14^h 13^m + 51^\circ 50'$) 6802.

Leicht für kleine Instrumente. Hauptstern 5. Gr. gelblich-weiß, Be-

gleiter 7,5. Gr. weiß. Die Sterne haben gemeinsame Eigenbewegung. 1899: $p = 33^{\circ}.1$, $d = 38''.6$.

π ($14^h 36^m + 16^{\circ} 51'$) 6954.

Ein Stern 5. Gr. mit einem Begleiter 6. Gr., beide sehr weiß. Optisches System. 1903: $p = 103^{\circ}.3$, $d = 5''.8$. Ohne Änderung.

ζ ($14^h 36^m + 14^{\circ} 9'$) 6955.

Ein physisches System von sehr langer Umlaufszeit. Die Distanz nimmt gegenwärtig wieder zu. Beide Komponenten sind weiß, die hellere 3,5, die schwächere 3,9., Gr. *Burnham* 1905: $p = 145^{\circ}.9$, $d = 0''.4$.

ϵ ($14^h 41^m + 27^{\circ} 30'$) 6993.

Ein ausgezeichnetes Paar und bekanntes Prüfungsobjekt für kleine Instrumente. Der Hauptstern ist 3., der Begleiter 6,3. Gr., ersterer sehr gelb, letzterer tiefblau. 1903: $p = 330^{\circ}.3$, $d = 2''.8$; Änderung sehr gering.

39 ($14^h 46^m + 49^{\circ} 8'$) 7031.

Die Komponenten dieses Paares sind 5,8. und 6,5. Gr. Der hellere Stern ist weiß, der schwächere purpurfarben. Beide haben gemeinsame Eigenbewegung. 1898: $p = 43^{\circ}.8$, $d = 3''.4$. Ohne Änderung.

ξ ($14^h 47^m + 19^{\circ} 31'$) 7034.

Ein interessantes physisches System. Der Begleiter hat seit der Entdeckung (1829) rund 160° in

seiner Bahnellipse zurückgelegt; die Umlaufszeit beträgt nach *Burnhams* Rechnungen etwa 175 Jahre. Das Periastron wurde um 1906 durchlaufen. 1905: $p = 176^{\circ}.0$, $d = 2''.5$. Hauptstern 4,7. Gr. gelb, Begleiter 6,6 Gr. purpurrot.

44 ($15^h 1^m + 48^{\circ} 3'$) 7120.

Ebenfalls ein physisches System mit langer Umlaufszeit. *Burnhams* letzte Messungen sind 1905: $p = 243^{\circ}.4$, $d = 4''.2$. Der gelbe Hauptstern ist 5,2., der blaue Begleiter 6,1. Gr.

δ ($15^h 11^m + 33^{\circ} 41'$) 7194.

Der gelbe Hauptstern 3,2. Gr. hat einen weißen Begleiter 7,4. Gr. Beide Sterne haben gemeinsame Eigenbewegung ohne gegenseitige Verschiebung. 1905: $p = 78^{\circ}.4$, $d = 104''.8$.

μ ($15^h 21^m + 37^{\circ} 44'$) 7258.

Dieser Stern 4. Gr. hat einen Begleiter 6,5. Gr., der durch gemeinsame Eigenbewegung mit ihm verbunden ist. 1903: $p = 171^{\circ}.8$, $d = 108''.3$.

Der Begleiter ist als μ^2 *Bootis* bekannt und stellt für sich einen physischen Doppelstern von langer Umlaufszeit (nach *Doberck* 275 Jahre) dar. Die Komponenten sind 6,7. und 7,3. Gr. und von grünlich-weißer Farbe. *Burnham* findet 1905: $p = 63^{\circ}.4$, $d = 1''.0$.

8. Camelopardalis. (Die Giraffe.)

9 *Hev.* ($3^h 49^m + 60^{\circ} 49'$) 1927.

Ein schönes Paar mit gemeinsamer Eigenbewegung. Hauptstern 5,0., Begleiter 8,2. Gr. Farben orange und blau. *Hussey* 1898: $p = 45^{\circ}.7$, $d = 1''.9$.

1 ($4^h 24^m + 53^{\circ} 42'$) 2220.

Optisches Paar. Die Sterne sind 5,1. und 6,2. Gr., ersterer weiß, letzterer bläulich-weiß. *Espin* 1901: $p = 306^{\circ}.7$, $d = 10''.2$.

2 ($4^h 32^m + 53^0 17'$) 2279.

Physisches System. Hauptstern 5,1. Gr. gelb, Begleiter 7,4. Gr. bläulich. *Burnham* 1901: $p = 288^0.7$, $d = 1''.5$. Der Hauptstern hat außerdem einen ebenfalls physischen Begleiter in $d = 0''.2$.

β ($4^h 55^m + 60^0 18'$) 2455.

Die Sterne sind 5. und 9. Gr. *Burnham* 1903: $p = 208^0.2$, $d = 80''.9$.

9. Canes venatici.

2 ($12^h 11^m + 41^0 13'$) 6102.

Zwei Sterne mit gemeinsamer Eigenbewegung. Der hellere 5,7., der schwächere 8,0. Gr. Farben goldgelb und blau. 1898: $p = 358^0.7$, $d = 11''.6$.

12 ($12^h 51^m + 38^0 52'$) 6313.

Leicht zu beobachtender Doppelstern. Die beiden Komponenten sind 3,2. und 5,7. Gr. und haben gemeinsame Eigenbewegung. 1898: $p = 227^0.4$, $d = 19''.8$.

10. Cancer. (Der Krebs.)

ζ ($8^h 6^m + 17^0 57'$) 4477.

Ein bekanntes physisches System, bestehend aus drei Sternen: A 5,0., B 5,7., C 5,5. Gr. Die Bahn AB gehört zu den bestbekannten Doppelsternbahnen; der Begleiter hat seit der Entdeckung durch *Struve* (1826) schon weit mehr als einen vollen Umlauf zurückgelegt. Die Umlaufszeit wurde von zahlreichen Berechnern fast übereinstimmend zu rund 60 Jahren gefunden. Die Distanz beträgt zur Zeit etwa $0''.8$.

11/12 ($4^h 57^m + 58^0 51'$) 2480.

Ein sehr weites Paar. Hauptstern 5,0. Gr. bläulich, Begleiter 6,0. Gr. gelb-rot. 1904: $p = 8^0.0$, $d = 180''.3$.

35 ($5^h 56^m + 51^0 35'$) 3099.

Optisches Paar. Der eine Stern 6,3., der andere 8,3. Gr. 1898: $p = 13^0.3$, $d = 39''.5$.

56 ($8^h 8^m + 60^0 42'$) 4481.

Dreifach. A 6,8., B 10,5., C 10,2. Gr. AB 1905: $p = 256^0.6$, $d = 2''.6$. AC 1905: $p = 222^0.8$, $d = 48^0.6$.

(Die Jagdhunde.)

17 ($13^h 5^m + 39^0 2'$) 6410.

Ein sehr weites Paar. 1898: $p = 297^0.2$, $d = 285''.6$. Die Komponenten sind 5,5. und 5,9. Gr.

25 ($13^h 33^m + 36^0 48'$) 6566.

Physischer Doppelstern mit langer Umlaufszeit (nach *See* 184 Jahre). Hauptstern 5,7., Begleiter 7,6. Gr. Farben weiß und blau. *Doolittle* findet 1903: $p = 133^0.2$, $d = 1''.3$.

Der entferntere Begleiter C (*Struve* 1821) bewegt sich in weiter Bahn um das System AB, hat seit der Entdeckung aber erst ein kurzes Stück seiner Bahnellipse zurückgelegt. Distanz etwa $5''$.

φ^2 ($8^h 21^m + 27^0 16'$) 4601.

Ein optisches System ohne Änderung der Positionen. Die Komponenten sind 6,0. bzw. 6,5. Gr. 1903: $p = 216^0.0$, $d = 5''$.

θ ($8^h 26^m + 18^0 26'$) 4655.

Ein optisches System. Die Änderung der Positionen rührt von der Eigenbewegung des helleren Sternes her. Dieser ist 5.—6. Gr. und von gelber Farbe, der blaue Begleiter 10. Gr. 1903: $p = 60^0.8$, $d = 63''.1$.

ϵ ($8^h 34^m + 20^0 20'$) 4711.

Die Sterne sind 5,7. und 7,0. Gr. 1875: $p = 249^0.2$, $d = 134''.2$.

ι ($8^h 41^m + 29^0 8'$) 4763.

Hauptstern 4,4., Begleiter 6,5. Gr. Farben: gelb und bläulich. 1899: $p = 307^0.3$, $d = 30''.6$. Ohne Änderung.

11. Canis major. (Großer Hund.)

ν^1 ($6^h 32^m - 18^0 35'$) 3503.

Leicht trennbares Paar. Hauptstern 6,5., Begleiter 8. Gr. Ersterer weiß, letzterer bläulich. 1893: $p = 264^0.2$, $d = 17''.0$.

19 ($6^h 51^m - 20^0 1'$) 3721.

Zwei Sterne mit gemeinsamer Eigenbewegung. Größen 5,7 und 9,5.

12. Capricornus. (Der Steinbock.)

β ($20^h 15^m - 15^0 6'$) 10112.

Ein sehr weites Paar mit anscheinend gleicher Eigenbewegung. Hellere Komponente 2,5. Gr. gelb, schwächere Komponente 6,0. Gr. blau. *Burnham* 1903: $p = 266^0.9$, $d = 205''.2$.

π ($20^h 22^m - 18^0 32'$) 10207.

Entdeckt von *Burnham* am 6-Zöller. Hauptstern 5,1., Begleiter 8,7. Gr. 1901: $p = 145^0.5$, $d = 3''.3$.

ρ ($20^h 23^m - 18^0 9'$) 10228.

Vierfach. A5., B10., C13,2., D7. Gr. Von *Burnham* am 6-Zöller entdeckt.

ι^2 ($8^h 48^m + 30^0 57'$) 4839.

System mit gemeinsamer Eigenbewegung. Die eine Komponente ist 5,9., die andere 6,4. Gr., beide gelb gefärbt. 1903: $p = 325^0.9$, $d = 1''.4$.

64 ($8^h 53^m + 32^0 48'$) 4874.

Hauptstern 5,5., Begleiter 9,4. Gr. 1902: $p = 295^0.3$, $d = 88''.7$.

66 ($8^h 55^m + 32^0 39'$) 4883.

Ein sehr weißer Stern 6,1. Gr. mit einem blauen Begleiter 8,2. Gr. 1897: $p = 136^0.7$, $d = 4''.8$.

Burnham findet 1905: $p = 18^0.3$, $d = 11''.2$.

μ ($6^h 52^m - 13^0 55'$) 3725.

Ein gelber Stern 4,7. Gr. mit einem blauen Begleiter 8,0. Gr. 1902: $p = 334^0.5$, $d = 2''.3$. Änderung, wenn überhaupt vorhanden, sehr gering.

AB 1899: $p = 172^0.0$, $d = 2''.6$.

AC 1901: $p = 150^0.9$, $d = 55''.2$.

AD 1899: $p = 150^0.1$, $d = 247''.0$.

σ ($20^h 24^m - 18^0 55'$) 10246.

Zwei Sterne mit gemeinsamer Eigenbewegung aber ohne gegenseitige Änderung. Die eine Komponente 6., die andere 7. Gr. 1904: $p = 239^0.7$, $d = 21''.7$.

ϵ ($21^h 31^m - 19^0 55'$) 11077.

Ein Stern 6. Gr. mit einem Begleiter 9. Gr. 1903: $p = 47^0.3$, $d = 68''.3$.

13. Cassiopeia.

4 ($23^h 20^m + 61^{\circ} 44'$) 10354.

Vierfach. $A 6,0.$, $B 8,5.$, $C 9,5.$,
 $D 10,5.$ Gr. *Burnham* gibt:
 AB 1903: $p = 226^{\circ}.5$, $d = 97''.6$.
 AC 1879: $p = 258^{\circ}.3$, $d = 214^{\circ}.3$.
 CD 1879: $p = 35^{\circ}.3$, $d = 10^{\circ}.3$.

6 ($23^h 44^m + 61^{\circ} 39'$) 12575.

Gemeinsame Eigenbewegung
beider Komponenten ohne gegen-
seitige Stellungsänderung. 1901:
 $p = 198^{\circ}.7$, $d = 1''.7$.

σ ($23^h 54^m + 55^{\circ} 12'$) 12666.

Doppelt, ohne Änderung der
Komponenten. Hauptstern 5,4. Gr.
grün, Begleiter 7,5. Gr. tiefblau.
1902: $p = 327^{\circ}.4$, $d = 3''.1$.

λ ($0^h 26^m + 53^{\circ} 58'$) 260.

Physisches System von langer Um-
laufzeit. Der Positionswinkel wächst
sehr langsam. Der Hauptstern ist
5,6., der Begleiter 5,9. Gr. 1898:
 $p = 152^{\circ}.1$, $d = 0''.6$.

α ($0^h 35^m + 55^{\circ} 59'$) 361.

Der Begleiter wird von *Herschel*
viel zu schwach geschätzt (14. Gr.).
Erist 9. Gr. und *Burnham* erkannte ihn
am 1-Zöller ohne Schwierigkeit. Die
kleine Änderung im Positionswinkel
rührt von der Eigenbewegung her.
1903: $p = 280^{\circ}.2$, $d = 64''.1$. Näher
bei α noch zwei sehr schwache Sterne.

σ ($0^h 39^m + 47^{\circ} 44'$) 395.

Von *Burnham* am 6-Zöller ent-

deckt. Hauptstern 5,5., Begleiter
12,0. Gr. 1904: $p = 303^{\circ}.8$, $d = 32''.7$.

η ($0^h 43^m + 57^{\circ} 17'$) 426.

Ein sehr interessantes und selbst
mit den kleinsten Fernrohren stets
leicht zu beobachtendes Doppelstern-
system. Die Berechnungen der Um-
laufzeit schwanken in ihren Ergeb-
nissen zwischen 167 und 500 Jahren.
Der Hauptstern ist 4,0., der Begleiter
7,6. Gr., ersterer gelb, letzterer
purpurfarben. 1899: $p = 215^{\circ}.9$,
 $d = 5''.2$.

ψ ($1^h 19^m + 67^{\circ} 36'$) 732.

Dreifaches System, optisch. $A 4,5.$,
 $C 8,9.$, $D 9,5.$ Gr.
 AC 1900: $p = 108^{\circ}.0$, $d = 27''.4$.
 CD 1898: $p = 255^{\circ}.4$, $d = 2^{\circ}.9$.

48 ($1^h 54^m + 70^{\circ} 25'$) 1036.

Ein interessantes physisches
System, zur Zeit der Entdeckung
(1878) im 6-Zöller leicht erkennbar,
jetzt infolge der ständig abnehmen-
den Distanz äußerst schwierig. 1904:
 $p = 65^{\circ}.2$, $d = 0''.4$. In größerer Ent-
fernung vom Hauptstern zwei äußerst
schwache Objekte 13. und 14. Gr.

ι ($2^h 21^m + 66^{\circ} 57'$) 1262.

Triplet mit gemeinsamer Eigen-
bewegung. $A 4,2.$ Gr. gelb, $B 7,1.$ Gr.
blau, $C 8,1.$ Gr. blau.
 AB 1904: $p = 253^{\circ}.7$, $d = 2''.2$.
 AC 1904: $p = 111^{\circ}.2$, $d = 7^{\circ}.5$.

14. Cepheus.

α ($20^h 12^m + 77^{\circ} 25'$) 10085.

Schönes Paar. Der grünlich-weiße
Hauptstern 4. Gr. hat einen blauen
Begleiter 8. Gr. Beide Komponenten
bewegen sich gemeinsam im Raume.
1899: $p = 122^{\circ}.8$, $d = 7''.5$.

η ($20^h 43^m + 61^{\circ} 27'$) 10535.

Ein optisches Paar. Die Änderung
der Positionen rührt von der Eigen-
bewegung der helleren Komponente
her. Diese ist 3,5., der Begleiter
11. Gr. 1900: $p = 38^{\circ}.6$, $d = 85''.2$.

β ($21^h 27^m + 70^0 7'$) 11046.

Beide Komponenten sind gemeinsam bewegt, aber fest zueinander. Hauptstern 3. Gr. grünlich-weiß, Begleiter 8. Gr. blau. 1905: $p=250^0.1$, $d=13''.3$.

ξ ($22^h 1^m + 64^0 8'$) 11483.

Anscheinend ein System vom 61 Cygni-Typ., wo die Änderung von einem geringen Unterschied in den Eigenbewegungen der beiden Komponenten herrührt. Im übrigen ein leicht zu beobachtendes Paar für kleinere Fernrohre. Hauptstern 4,7. Gr. gelblich, Begleiter 6,5. Gr. blau. 1905: $p=281^0.9$, $d=6''.9$.

δ ($22^h 25^m + 57^0 54'$) 11772.

Der bekannte Veränderliche hat einen Begleiter 5,3. Gr., der an-

scheinend dieselbe Eigenbewegung besitzt wie jener. Die Farben der beiden Sterne sind gelb bzw. blau. 1898: $p=191^0.5$, $d=40''.9$.

π ($23^h 5^m + 74^0 51'$) 12196.

Dieses enge Paar bildet einen physischen Doppelstern von langer Umlaufszeit. Der gelbliche Hauptstern ist 5,2. Gr., der purpurfarbene Begleiter 7,5. Gr. Die Distanz nimmt gegenwärtig ab, der Positionswinkel zu. 1903: $p=52^0.2$, $d=0''.9$.

α ($23^h 15^m + 67^0 34'$) 12304.

Ein Sternpaar mit gemeinsamer Eigenbewegung. Hellere Komponente 5,2. Gr. gelb, schwächere Komponente 7,8. Gr. tiefblau. 1902: $p=199^0.3$, $d=2''.9$.

15. Cetus. (Der Walfisch.)

26 ($0^h 59^m + 0^0 50'$) 553.

Ein Stern 6,6. Gr. mit einem Begleiter 9. Gr. Beide haben gemeinsame Eigenbewegung. Der hellere Stern ist weiß, der schwächere blau. 1903: $p=253^0.5$, $d=16''.0$.

37 ($1^h 9^m - 8^0 28'$) 655.

Ein weites Paar. Hauptstern 5,1., Begleiter 7,0. Gr. 1904: $p=331^0.3$, $d=49''.4$.

42 ($1^h 15^m - 1^0 2'$) 707.

Möglicherweise ein physisches System, doch kann die Änderung der Positionen auch von der Eigenbewegung der helleren Komponente herrühren. Diese ist 6,2., der Begleiter 7,2. Gr. 1903: $p=357^0.5$, $d=1''.5$.

ζ ($1^h 37^m - 11^0 49'$) 877.

Wahrscheinlich ein physisches System. Hauptstern 5,3. Gr., weiß,

Begleiter 6,9. Gr. gelblich-weiß. Die Distanz nimmt langsam ab. 1904: $p=89^0.1$, $d=3''.1$.

66 ($2^h 8^m - 2^0 52'$) 1149.

Wahrscheinlich ein physisches System. Die Komponenten haben gemeinsame Eigenbewegung, aber ihre gegenseitige Verschiebung ist sehr gering. Der Hauptstern ist 6., der Begleiter 7,8. Gr. Die Farben sind gelb bzw. blau. 1901: $p=232^0.2$, $d=15''.5$.

α ($2^h 14^m - 3^0 26'$) 1209.

Dieser bekannte Veränderliche hat einen Begleiter 10. Gr. in $d=79^0.5$, $p=117''$.

ν ($2^h 31^m + 5^0 9'$) 1328.

Hauptstern 5. Gr. gelb, Begleiter 9,6. Gr. grau. Distanz und Positionswinkel sind ohne Änderung. 1903: $p=82^0.3$, $d=7''.6$.

84 ($2^h 36^m - 1^0 7'$) 1386.

Sternpaar mit gemeinsamer Eigenbewegung. Der Positionswinkel nimmt etwas ab. Die Sterne sind 6. und 9. Gr., ihre Farben gelb und grau. 1899: $p = 320^0.6$, $d = 4''.5$.

16. Coma Berenices. (Haar d. Berenice.)

2 ($11^h 59^m + 22^0 1'$) 6018.

Ein weißer Stern 6. Gr. mit einem blauen Begleiter 7.5. Gr. Die beiden Komponenten haben gemeinsame Eigenbewegung. 1897: $p = 237^0.1$, $d = 3''.9$.

12 ($12^h 17^m + 26^0 24'$) 6148.

Optisches Paar. Die Sterne sind 5. und 8. Gr. Die Farbe des helleren ist weiß, die des schwächeren rot. 1904: $p = 167^0.2$, $d = 65''.2$.

17 ($12^h 24^m + 26^0 28'$) 6180.

Ein weißer Stern 4,8 Gr. mit einem bläulich-weißen Begleiter 6. Gr. Die beiden Komponenten haben gemeinsame Eigenbewegung. 1899: $p = 250^0.4$, $d = 145^0.3$.

24 ($12^h 30^m + 18^0 56'$) 6212.

Optisches Paar. Sehr hübsch für kleine Fernrohre. Hellere Kom-

γ ($2^h 38^m + 2^0 49'$) 1401.

Ein verhältnismäßig leicht zu beobachtendes Paar. Die Komponenten bilden wahrscheinlich ein physisches System. Der gelbe Hauptstern ist 3. Gr., der aschgraue Begleiter 6,8. Gr. 1903: $p = 291^0.4$, $d = 3''.1$.

ponente 4,7. Gr. gelb, schwächere Komponente 6,2. Gr. tiefblau. 1902: $p = 271^0.4$, $d = 20''.5$.

32/33 ($12^h 47^m + 17^0 37'$) 6292.

Sehr weites Paar. Die Sterne sind 5,3. und 6,1. Gr., ersterer von gelber, letzterer von weißer Färbung. 1898: $p = 49^0.4$, $d = 195''.6$.

35 ($12^h 48^m + 21^0 47'$) 6296.

Dreifach. A 5,0. Gr. gelb, B 7,8. Gr. blau, C 9,0. Gr. A und B bilden vielleicht ein physisches System von sehr langer Umlaufszeit. (Gore findet 228 Jahre.) Das weite Paar A und C läßt keine Änderung erkennen.

AB 1905: $p = 79^0.2$, $d = 1''.4$.

AC 1903: $p = 125^0.5$, $d = 29^0.1$.

17. Corona borealis. (Nördl. Krone.)

η ($15^h 19^m + 30^0 39'$) 7251.

Eines der am besten bekannten und interessantesten Doppelsternsysteme. Die Umlaufszeit des Begleiters beträgt 41 Jahre, so daß dieser Stern seit seiner Entdeckung durch *Struve* (1826) schon weit mehr als zwei Umläufe vollendet hat. Die Distanz ist im Maximum $1''.1$ bei einem Positionswinkel von 34^0 . Der Hauptstern ist 5,2., der Begleiter 5,7. Gr.

ζ ($15^h 36^m + 36^0 58'$) 7352.

Schönes und ziemlich leicht zu beobachtendes Paar. Ein grüner Stern 4. mit einem ebenfalls grünen Begleiter 5. Gr. Die gegenseitige Lage der beiden Komponenten ist fest. 1903: $p = 304^0.3$, $d = 6''.2$.

σ ($16^h 11^m + 34^0 7'$) 7563.

Ein physisches System von sehr langer Umlaufszeit. (1100 Jahre?) Die Distanz hat jetzt so weit zu-

genommen, daß der Begleiter auch in kleineren Fernrohren sichtbar ist. — Größen und Farben der Komponenten: *A* 5,0. gelblich, *B* 6,1. bläulich; außerdem ein entfernterer Stern *C* 10,5. Gr., der nicht zum System gehört.

AB 1905: $p = 214^{\circ}.9$, $d = 4''.6$.

AC 1903: $p = 86^{\circ}.1$, $d = 62^{\circ}.0$.

18. Crater. (Der Becher.)

17 ($11^{\text{h}} 27^{\text{m}} - 28^{\circ} 42'$) 5820.

Leicht zu beobachtendes Paar.

ν ($16^{\text{h}} 19^{\text{m}} + 33^{\circ} 59'$) 7608.

Ein sehr weites Paar, dessen Komponenten über $6'$ voneinander ab-
stehen, und als ν^1 und ν^2 bekannt
sind. *Burnham* bemerkte, daß jeder
der beiden Sterne für sich doppelt
ist. Für ν^1 findet er als Distanz des
Begleiters $66''$, für ν^2 $104''$. ν^1 und
 ν^2 sind 5., ihre beiden Begleiter
10. Gr.

Beide Sterne sind 5. Gr. 1903:

$p = 210^{\circ}.0$, $d = 9''.0$.

19. Cygnus. (Der Schwan.)

3 ($19^{\text{h}} 21^{\text{m}} + 24^{\circ} 44'$) 9300.

Optisches Paar. Die Änderung
des Positionswinkels und der Distanz
ist durch die Eigenbewegung des
helleren Sternes bedingt. 1905:
 $p = 72^{\circ}.2$, $d = 31''.9$.

β ($19^{\text{h}} 27^{\text{m}} + 27^{\circ} 45'$) 9374.

Ein prachtvoller Doppelstern.
Jedes Fernrohr zeigt den Begleiter.
Besonders schön ist der Farben-
kontrast zwischen dem gelben
Hauptstern 3. Gr. und dem tief-
blauen Begleiter 5. Gr. Keine
Änderung der Positionen nachweis-
bar. 1896: $p = 55^{\circ}.5$, $d = 34''.7$.

16 ($19^{\text{h}} 39^{\text{m}} + 50^{\circ} 18'$) 9560.

Beide Sterne dieses Paares sind
5. Gr. und gelblich-weiß. Leicht zu
beobachten. 1905: $p = 134^{\circ}.8$,
 $d = 38''.2$.

ζ ($19^{\text{h}} 43^{\text{m}} + 33^{\circ} 30'$) 9617.

Dieser, ebenfalls als ζ bezeichnete
Stern ist nicht mit dem bekannten
langperiodischen Veränderlichen zu
verwechseln. Die Komponenten
dieses Paares sind 5. und 8. Gr., die
hellere ist tiefgelb, die schwächere

bläulich gefärbt. 1905: $p = 70^{\circ}.9$,
 $d = 25''.5$.

δ ($19^{\text{h}} 42^{\text{m}} + 44^{\circ} 53'$) 9605.

Ein physisches System von langer
Umlaufszeit. Die Bahn des Be-
gleiters kann aus den bisherigen
Messungen noch nicht mit Sicher-
heit ermittelt werden. Nach *Burn-
ham* genügen die vorliegenden Be-
obachtungen ebensogut einer Ellipse
von 1040 Jahren, wie einer Kreis-
bahn von 420 Jahren oder einer
Ellipse von 300 Jahren Umlaufszeit.
Der grüne Hauptstern ist der 3.,
der graue Begleiter 8. Gr. 1905:
 $p = 294^{\circ}.5$, $d = 1''.6$.

ψ ($19^{\text{h}} 53^{\text{m}} + 52^{\circ} 10'$) 9765.

Ein weißer Stern 5. Gr. mit einem
grauen Begleiter 7,5. Gr. Eine Än-
derung der Positionen geht aus den
Messungen nicht hervor. 1902:
 $p = 181^{\circ}.0$, $d = 3''.5$.

26 ($19^{\text{h}} 59^{\text{m}} + 49^{\circ} 50'$) 9854.

Hauptstern 5,3., Begleiter 8,5. Gr.
Positionswinkel und Distanz ohne
Änderung. 1901: $p = 243^{\circ}.4$,
 $d = 4''.2$.

α^2 ($20^h 10^m + 46^\circ 26'$) 10036.

Weites Paar. Hauptstern 3,7. Gr. gelb, Begleiter 6,5. Gr. blau. 1869: $p = 173^0.7$, $p = 107''.1$.

48 ($20^h 33^m + 31^\circ 13'$) 10373.

Dieser Stern 6. Gr. hat einen entfernten Begleiter ebenfalls 6. Gr. 1904: $p = 175^0.3$, $d = 180''.0$.

49 ($20^h 37^m + 31^\circ 57'$) 10437.

Ein gelber Stern 6. Gr. mit einem blauen Begleiter 8. Gr. Positionswinkel und Distanz erleiden keine Änderung. 1890: $p = 48^0.4$, $d = 2''.9$.

52 ($20^h 42^m + 30^\circ 21'$) 10506.

Hauptstern 4. Gr. gelb, Begleiter 9,2. Gr. Distanz und Positionswinkel ohne Änderung. 1895: $p = 63^0.4$, $d = 6''.3$.

λ ($20^h 43^m + 36^\circ 7'$) 10533.

Dreifach. A 5,0., B 6,3., C 8,7. Gr. A und B bilden ein enges Paar, das vielleicht physisch zusammengehört. Die bisher beobachtete Verschiebung des schwächeren Sternes gegen den helleren läßt die Frage noch offen, ob es sich um Bahnbewegung oder Eigenbewegung handelt.

Distanz und Positionswinkel der dritten Komponente lassen keine Änderung erkennen.

AB 1903: $p = 62^0.8$, $d = 0''.7$.
 AB u. C 1880: $p = 105^0.2$, $d = 85^0.0$.

59 ($20^h 56^m + 47^\circ 8'$) 10670.

Ein dreifacher Stern. A 4,7., B 9,0., C 11,5. Gr. Die Komponenten sind relativ zueinander in Ruhe. Als Farben werden angegeben: A grünlich-weiß, B blau. Nach *Burnham* gelten folgende Positionen: AB 1905: $p = 352^0.8$, $d = 20''.4$.
 AC 1905: $p = 141^0.0$, $d = 26''.7$.

61 ($21^h 2^m + 38^\circ 15'$) 10732.

Dieses Doppelsystem ist durch *Bessels* Parallaxenmessung berühmt geworden. Seine große Eigenbewegung von über $5''$ im Jahre, ließ es für diesen Zweck besonders geeignet erscheinen.

Die Bewegung des Begleiters verläuft bis jetzt innerhalb der Beobachtungsgenauigkeit durchaus geradlinig. Zum Nachweis des Bestehens oder Nichtbestehens einer Bahnkrümmung bedürfte es nach *Burnham* noch mindestens 50 Jahre weiterer Beobachtung. Für 1905 gibt *Burnham* $p = 127^0.2$, $d = 22''.5$. Bei der Entdeckung des Begleiters durch *Struve* (1830) war $p = 90^0.6$, $d = 15''.5$; *Bessel* maß: $p = 95^0.3$, $d = 16''.2$.

τ ($21^h 11^m + 37^\circ 37'$) 10846.

Ein physisches System mit kurzer Umlaufszeit von 45 Jahren. Entdeckt von *Alvan Clark* mit dem 26-Zöller des *Mc. Cormick* Obs. Der Hauptstern ist 4,9., der Begleiter 7,4. Gr. *Aitken* gibt für 1905: $p = 269^0.6$, $d = 0''.6$. Die Distanz ist gegenwärtig im Zunehmen begriffen.

ν ($21^h 14^m + 34^\circ 29'$) 10885.

Dieser Stern 5. Gr. hat zwei Begleiter 10. Gr. Die Komponenten scheinen relativ fest zu sein. *Hussey* gibt folgende Messungen:

AB 1898: $p = 220^0.5$, $d = 15''.1$.
 AC 1898: $p = 179^0.9$, $d = 21^0.4$.

75 ($21^h 36^m + 42^\circ 49'$) 11164.

Dreifach. A 5,2., B 10,5., C 9,4. Gr. Das enge Paar AB von *Alvan Clark* entdeckt und ziemlich schwierig. Die letzten Messungen sind folgende: AB 1902: $p = 327^0.2$, $d = 2''.5$.
 AC 1886: $p = 354^0.8$, $d = 55''.3$.

79 ($21^h 39^m + 37^o 50'$) 11208.

Ein weites Sternpaar. *A* 5., *B* 7. Gr. *Espin* gibt folgende Messungen: 1905: $p = 60^o.0$, $d = 152''.7$. Etwas näher bei *A* noch ein sehr schwacher Begleiter.

μ ($21^h 40^m + 28^o 18'$) 11214.

Vierfach. *A* 4.0., *B* 5.0., *C* 11.5., *D* 6.2. Gr. — Farben: *A* weiß, *B* bläulich-weiß. *AB* ist ein System

20. Delphinus.

1 ($20^h 26^m + 10^o 34'$) 10266.

Dieses enge Paar wurde von *Burnham* mit dem 6-Zöller entdeckt. Eine Änderung der Positionen ist bisher nicht zu bemerken. Die beiden Komponenten sind 8. Gr. 1898: $p = 353^o.9$, $d = 0''.9$.

β ($20^h 33^m + 14^o 15'$) 10363.

Ein sehr interessantes System. Das enge Paar *AB* wurde im August 1878 von *Burnham* mit dem 6-Zöller entdeckt. Die Distanz war damals $0''.7$. Schon die nächsten Messungen ließen keinen Zweifel darüber, daß man es mit einem physischen System zu tun habe. Die Umlaufszeit ist kurz, nach den neuesten Rechnungen etwa 27 Jahre, die Exzentrizität der Bahnellipse 0.36. Gegenwärtig befindet sich der Begleiter im Apastron, so daß ihn auch kleinere Instrumente zeigen müßten. Der Positionswinkel ist nahe 360^o .

Ein entfernterer optischer Begleiter, dessen Distanz und Positionswinkel sich infolge der Eigenbewegung des Systems *AB* ändert, ist ebenfalls leicht zu erkennen. *Burnham* gibt dafür folgende Messungen: 1905: $p = 330^o.5$, $d = 37''.5$. Der Stern ist 11. Gr.

vom 61 *Cygni*-Typus, indem die Bewegung von *B* relativ zu *A* ganz geradlinig verläuft. Die geringste Distanz von etwa $0''.7$ wird in 35 Jahren erreicht sein. *Burnham* gibt für 1905: $p = 125^o.2$, $d = 2''.3$.

Für die beiden anderen Sterne, die nicht zum System gehören, gelten nach *Burnham* folgende Messungen:

AC 1900: $p = 271^o.3$, $d = 41''.0$.

AD 1906: $p = 54.1$, $d = 206.1$.

(Der Delphin.)

α ($20^h 34^m + 9^o 44'$) 10390.

Ein optisches System. Die beiden Sterne entfernen sich infolge der Eigenbewegung des helleren immer weiter voneinander. 1904: $p = 302^o.4$, $d = 16''.4$.

Der hellere Stern ist 4.7., der schwächere 11.3. Gr. Ein Stern 8.8. Gr., der in $d = 214''$ steht, ist identisch mit $\text{BD} + 9^o 4602$.

γ ($20^h 42^m + 15^o 46'$) 10509.

Prächtiger Doppelstern auch für kleine Fernrohre. Ein goldgelber Stern 4. Gr. mit einem blaugrünen Begleiter 5. Gr. Die relative Verschiebung ist sehr gering, aber die Komponenten haben eine gemeinsame Eigenbewegung von nicht geringem Betrage. 1902: $p = 271^o.0$, $d = 11''.2$.

13 ($20^h 43^m + 5^o 38'$) 10520.

Ein enges Paar, aber im 6-Zöller auflösbar. Die Messungen zeigen keine Änderung der Distanz und des Positionswinkels. Die hellere Komponente ist 5.2., die schwächere 8.8. Gr. 1900: $p = 188^o.2$, $d = 1''.4$.

21. Draco. (Der Drache.)

η ($16^h 23^m + 61^o 44'$) 7634.

Dieser Stern 2. Gr. hat einen nahen Begleiter 8. Gr., der mit ihm durch gemeinsame Eigenbewegung verbunden ist. Die Distanz scheint etwas zu wachsen. 1901: $p = 143^o.1$, $d = 5''.4$.

16/17 ($16^h 34^m + 53^o 6'$) 7702.

Ein weites Paar von zwei Sternen 5. Gr. *Hussey* gibt folgende Messungen: 1902: $p = 14^o.0$, $d = 90''.3$.

17 wurde von *Struve* als enger Doppelstern erkannt. Die eine Komponente ist 5., die andere 6. Gr. Nach *Hussey* gilt für 1902: $p = 111^o.7$, $d = 3''.9$.

μ ($17^h 3^m + 54^o 36'$) 7878.

Entdeckt von *Herschel* im Jahre 1779 und wahrscheinlich ein physisches System von sehr langer Umlaufzeit. Die Form der scheinbaren Bahn ist noch ganz unbekannt, da die bisherigen Messungen ebensogut einer Ellipse von 280 Jahren wie einer Kreisbahn von fast 1200 Jahren Umlaufzeit genügen. *Burnham* gibt folgende Messungen: 1905: $p = 142^o.2$, $d = 2''.2$. Beide Sterne sind 5. Gr.

γ^1/γ^2 ($17^h 30^m + 55^o 15'$) 8076.

Zwei gelblichweiße Sterne 4,6. Gr. Eine gegenseitige Änderung der Positionen geht aus den Messungen seit *Struve* nicht hervor. 1899: $p = 312^o.0$, $d = 62''.0$.

φ ($17^h 44^m + 72^o 12'$) 8182.

Ein leicht zu trennendes Paar. Der eine Stern ist 4., der andere

5. Gr., beide sind weiß. Die Komponenten haben gemeinsame Eigenbewegung, zeigen aber keine relative Verschiebung. 1904: $p = 15^o.3$, $d = 30''.4$.

39 ($18^h 22^m + 58^o 45'$) 8574.

Dieser Stern 4,7. Gr. hat zwei Begleiter: *B* 7,7. Gr. bläulich weiß, *C* 7,1. Gr. grau. Der Positionswinkel des Paares *AB* scheint ein wenig abzunehmen, die Distanz zu wachsen. In *C* dagegen keine Änderung. *AB* 1903: $p = 358^o.2$, $d = 3''.7$. *AC* 1903: $p = 20^o.8$, $d = 88^o.8$.

40/41 ($18^h 8^m + 79^o 59'$) 8441.

Ebenfalls ein leicht zu trennendes Paar. Hauptstern 5,4., Begleiter 6,1. Gr. Positionswinkel und Distanz lassen eine sehr geringe Änderung erkennen. 41 *Drac.* = *A*, 40 = *B*. 1887: $p = 234^o.1$, $d = 20''.1$.

σ ($18^h 50^m + 59^o 16'$) 8906.

Ein leicht zu trennendes optisches Paar. Der eine Stern ist 4,6., der andere 7,6. Gr., ersterer weiß, letzterer aschgrau. 1905: $p = 333^o.5$, $d = 32''.1$. Die Änderung dieser Größen rührt von der Eigenbewegung des helleren Sternes her.

ϵ ($19^h 49^m + 70^o 1'$) 9713.

Sehr geringe Änderung im Positionswinkel und gemeinsame Eigenbewegung. Hauptstern 4,0. Gr. gelb, Begleiter 7,6. Gr. blau. Nach *Burnham* gelten folgende Messungen: 1905: $p = 1^o.9$, $d = 3''.1$.

22. Equuleus. (Das Füllen.)

ϵ ($20^h 54^m + 3^o 55'$) 10643.

Ein dreifaches physisches System. Die Komponenten haben gemein-

same Eigenbewegung. Die Bahnebene des Systems *AB* liegt in der Gesichtslinie, so daß nur die Distanz

sich ändert. Die Annäherung der beiden Komponenten dürfte gegenwärtig so groß sein, daß sie in kleineren Instrumenten nicht trennbar sind. A 5,7., B 6,2., C 7,1. Gr.

AB und C 1903: $p=72^{\circ}.8$, $d=10''.6$.

λ ($20^h 57^m + 6^{\circ} 47'$) 10676.

Die Komponenten dieses Paares sind 6,5. Gr. und sehr weiß. Eine Änderung in den Positionen ist nicht wahrzunehmen.

1902: $p=221^{\circ}.4$, $d=2''.7$.

γ ($21^h 5^m + 9^{\circ} 44'$) 10782.

Vierfach. A 4,2., B 11., C 12., D 5,7. Gr. A und B bilden anscheinend ein physisches Paar, ohne daß bis jetzt eine relative Verschiebung nachgewiesen worden wäre. Der optische Begleiter C wurde von *Burnham* mit dem 6-Zöl-

ler entdeckt. Seine Verschiebung gegen A beruht lediglich auf der Eigenbewegung des helleren Sternes $D=6$ *Equulei*.

AB 1901: $p=272^{\circ}.0$, $d=2''.2$

AC 1901: $p=7^{\circ}.6$, $d=45''.0$

AD 1891: $p=152^{\circ}.9$, $d=355''.9$.

δ ($21^h 10^m + 9^{\circ} 36'$) 10829.

Optisches Paar. Der hellere Stern ist 4., der schwächere 10. Gr. Distanz und Positionswinkel ändern sich infolge der Eigenbewegung des helleren Sternes.

1901: $p=18^{\circ}.4$, $d=43''.9$.

Der Positionswinkel nimmt ab, die Distanz zu.

Der helle Stern stellt seinerseits ein physisches System mit sehr kurzer Umlaufszeit (5.7 Jahre nach *Hussey*) dar.

23. Eridanus.

ϵ^2 ($2^h 58^m - 8^{\circ} 5'$) 1549.

Entdeckt von *Burnham* mit dem 6-Zöller. Positionswinkel und Distanz scheinen ohne Änderung zu sein. Hauptstern 5,4., Begleiter 9,6. Gr.

1898: $p=83^{\circ}.8$, $d=2''.4$.

τ^1 ($3^h 15^m - 22^{\circ} 7'$) 1673.

Dreifach. A 4,5., B 10,7., C 10,5. Gr. Die bisherigen Messungen reichen nicht aus, zu bestimmen, ob AB fest ist oder nicht.

AB 1902: $p=290^{\circ}.4$, $d=5''.7$

AC 1902: $p=103^{\circ}.3$, $d=39''.6$.

β^2 ($3^h 49^m - 3^{\circ} 15'$) 1939.

Zwei gemeinsam bewegte Sterne. A 4. Gr. gelb, B 6. Gr. blau. Auch in kleinen Fernrohren trennbar.

1904: $p=346^{\circ}.3$, $d=6''.9$.

β^3 ($4^h 10^m - 10^{\circ} 30'$) 2102.

Anscheinend ein festes Paar mit gemeinsamer Eigenbewegung. Der hellere Stern ist 6., der schwächere 9. Gr. Die Farbe des ersteren wird als gelb, die des letzteren als blau bezeichnet.

1888: $p=150^{\circ}.1$, $d=6''.4$.

γ^2 ($4^h 11^m - 7^{\circ} 48'$) 2109.

Dreifach. A 4., B 9., C 10,8. Gr. B und C bilden zusammen ein physisches System, dessen Umlaufszeit *Burnham* zu 179.7 Jahren berechnete.

AB 1904: $p=105^{\circ}.3$, $d=82''.1$

BC 1904: $p=55^{\circ}.2$, $d=2''.4$.

δ^1 ($4^h 33^m - 2^{\circ} 40'$) 2287.

Der Begleiter dieses Sternes 6. Gr. ist sehr lichtschwach (12,2. Gr.) wurde jedoch von *Burnham* mit dem

6-Zöller entdeckt. Wahrscheinlich handelt es sich nur um ein optisches Paar. 1904: $p = 87^{\circ}.9$, $d = 31''.8$.

55 ($4^h 39^m - 8^{\circ} 59'$) 2330.

Dieses Paar dürfte schon vom kleinsten Fernrohr getrennt werden. Der eine Stern ist 6,2., der andere 6,7. Gr. Distanz und Winkel lassen keine Änderung erkennen.

1889: $p = 316^{\circ}.3$, $d = 9''.0$.

62 ($4^h 51^m - 5^{\circ} 20'$) 2432.

Hauptstern 5,7. Gr. Der Begleiter ist der Stern *BD* — $5^{\circ} 1093$ (9,0. Gr.).

1897: $p = 74^{\circ}.7$, $d = 66''.5$.

66 ($5^h 2^m - 4^{\circ} 47'$) 2530.

Hauptstern 6., Begleiter 9,2. Gr. *Burnham* gibt folgende Messungen:

1900: $p = 9^{\circ}.6$, $d = 52''.8$.

24. Gemini. (Die Zwillinge.)

20 ($6^h 26^m + 17^{\circ} 51'$) 3435.

Sehr leicht zu trennen. Ein gelblichweißer Stern 6,0. Gr. mit einem blauen Begleiter 6,9. Gr. Distanz und Positionswinkel sind fest.

1903: $p = 210^{\circ}.4$, $d = 19''.9$.

ϵ ($6^h 38^m + 25^{\circ} 14'$) 3568.

Dieser Stern hat einen schwachen Begleiter 9,5. Gr. in $d = 110''$, $p = 94^{\circ}$.

38 ($6^h 49^m + 13^{\circ} 18'$) 3692.

Die Komponenten dieses anscheinend physischen Paares haben gemeinsame Eigenbewegung. Der Winkel nimmt etwas ab, die Distanz zu.

1903: $p = 159^{\circ}.7$, $d = 6''.6$.

Hauptstern 5,4. Gr. gelb, Begleiter 7,7. Gr. blau.

ζ ($6^h 58^m + 20^{\circ} 43'$) 3797.

Dieser bekannte Veränderliche hat zwei Begleiter: *B* 10,5., *C* 8. Gr., für die *Burnham* folgende Messungen gibt:

AB 1880: $p = 83^{\circ}.6$, $d = 87''.2$

AC 1905: $p = 350^{\circ}.5$, $d = 95''.1$.

45 ($7^h 3^m + 16^{\circ} 5'$) 3844.

Ein rein optisches Paar, da die Änderung der Distanz und des Positionswinkels lediglich von der Ei-

genbewegung des helleren Sterns herührt. Dieser ist 5,0., der Begleiter 10,7. Gr.

1903: $p = 38^{\circ}.8$, $d = 4''.1$.

d nimmt zu, p ab.

λ ($7^h 12^m + 16^{\circ} 43'$) 3951.

Zwei Sterne, die durch gemeinsame Eigenbewegung miteinander verbunden sind. Der hellere 3,2., der schwächere 10,3. Gr.

1904: $p = 33^{\circ}.0$, $d = 9''.5$.

Eine Änderung dieser Größen ist nicht zu erkennen.

δ ($7^h 14^m + 22^{\circ} 10'$) 3970.

Vielleicht ein physisches System. Der Begleiter hat dieselbe Eigenbewegung wie der helle Stern; der Positionswinkel nimmt langsam zu, während die Distanz konstant bleibt. Der gelbe Hauptstern ist 3,2., der purpurrote Begleiter 8,2. Gr.

1904: $p = 208^{\circ}.0$, $d = 7''.0$

α ($7^h 28^m + 32^{\circ} 6'$) 4122.

Ein ausgezeichnetes Paar. Der grüne Begleiter 3,7. Gr. ist physisch mit dem Hauptstern verbunden. Die Umlaufszeit ist sehr groß, so daß der Begleiter seit seiner Entdeckung erst ein kurzes Bahnstück zurückgelegt hat. Aus diesem Grunde stimmen auch Bahnrechnungen sehr schlecht

überein, die Ergebnisse für die Umlaufszeit schwanken zwischen 232 und 1001 Jahren. In größerer Entfernung von diesem Paare steht ein Stern 9,5. Gr., der sich gemeinsam mit ihm durch den Raum bewegt.

AB 1903: $p = 224^{\circ}.3$, $d = 5''.7$

AC 1899: $p = 164^{\circ}.2$, $d = 73''.1$.

70 ($7^h 32^m + 35^{\circ} 16'$) 4164.

Fünffach. *A* 5., *B* 11., *C* 10., *D* 11., *E* 13. Gr. Das zweite Paar *BC* wurde von *Herschel* entdeckt, die Dupli-

zität von *C* von *Burnham* mit dem 6-Zöller.

CD 1898: $p = 244^{\circ}.2$, $d = 1''.8$

CE 1898: $p = 207^{\circ}.2$, $d = 17^{\circ}.7$

AB 1898: $p = 190^{\circ}.6$, $d = 99^{\circ}.2$

AC 1898: $p = 98^{\circ}.8$, $d = 160^{\circ}.7$

$\propto$ ($7^h 38^m + 24^{\circ} 38'$) 4226.

Herschel schätzt den Begleiter 14., *Struve* 10., *Dembowski* und *Otto Struve* nennen ihn 8,5. Gr. Auf Veränderlichkeit kann man aus diesen Angaben aber wohl nicht schließen.

1903: $p = 235^{\circ}.6$, $d = 6''.6$.

25. Herkules.

$\propto$ ($16^h 4^m + 17^{\circ} 19'$) 7514.

Ein optisches Paar. Die geringe Änderung der Distanz wird durch die Eigenbewegung des helleren Sterns hervorgerufen. Dieser ist 5., der Begleiter 6. Gr.

1898. $p = 11^{\circ}.2$, $d = 29''.7$.

γ ($16^h 18^m + 19^{\circ} 23'$) 7596.

Dieser weiße Stern 3,5. Gr. hat einen bläulichen Begleiter 9,5. Gr. Distanz und Positionswinkel zeigen geringe Veränderlichkeit.

1903: $p = 236^{\circ}.8$, $d = 41''.0$.

42 ($16^h 36^m + 49^{\circ} 7'$) 7714.

Hauptstern 4,0. Gr. Goldgelb, Begleiter 10,7. Gr. Die beiden Sterne haben gemeinsame Eigenbewegung.

1905: $p = 92^{\circ}.2$, $d = 23''.7$.

ζ ($16^h 38^m + 31^{\circ} 47'$) 7717.

Eines der am schnellsten umlaufenden Doppelsternsysteme. Der Begleiter hat seit den ersten Messungen mehr als zwei Revolutionen vollendet, seine Bahn ist daher gut bekannt. Die Umlaufszeit beträgt rund 34 Jahre. Im Maximum ist $d = 1''.6$, zur Zeit ab-

nehmend. Hauptstern 3,0. Gr. gelblich, Begleiter 6,5. Gr. rötlich.

43 ($16^h 41^m + 8^{\circ} 46'$) 7747.

Ein roter Stern 5., mit einem bläulichen Begleiter 9. Gr. Wohl nur ein optisches Paar.

1903: $p = 229^{\circ}.9$, $d = 82''.5$.

56 ($16^h 51^m + 25^{\circ} 54'$) 7805.

Hauptstern 6., Begleiter 11,9. Gr. In den Positionen keine Änderung.

1903: $p = 92^{\circ}.4$, $d = 18''.0$.

α ($17^h 10^m + 14^{\circ} 30'$) 7914.

Dieser stark rot gefärbte Veränderliche hat einen intensiv blauen Begleiter 6,0. Gr. Positionswinkel und Distanz haben sich seit den ersten Messungen nicht geändert.

1903: $p = 114^{\circ}.7$, $d = 4''.6$.

δ ($17^h 11^m + 24^{\circ} 57'$) 7922.

Ein System vom 61-Cygni-Typus, indem die Änderung von Distanz und Positionswinkel durch die ungleiche Eigenbewegung der beiden Sterne des Paares verursacht wird. Der Begleiter bewegt sich nahe rechtwinklig zum Hauptstern. Die Distanz verringert sich zunächst

noch, um später wieder zu wachsen. Hauptstern 3,0. Gr. grün, Begleiter 8,1. Gr. weiß.

1904: $p = 192^{\circ}.7$, $d = 14''.0$.

68 u ($17^h 14^m + 33^{\circ} 12'$) 7944.

Der Hauptstern ist veränderlich zwischen 4,6. und 5,4. Gr. Der Begleiter 10. Gr. läßt in Distanz und Positionswinkel keine Änderung erkennen.

1898: $p = 59^{\circ}.9$, $d = 4''.5$.

e ($17^h 20^m + 37^{\circ} 14'$) 8003.

Zwei Sterne mit gemeinsamer Eigenbewegung, der eine 4., der andere 5. Gr.

1904: $p = 312^{\circ}.2$, $d = 4''.0$.

u ($17^h 43^m + 27^{\circ} 47'$) 8162.

Wahrscheinlich ein physisches System; der Hauptstern ist 3,8., der Begleiter 9,5. Gr.; beide haben dieselbe Eigenbewegung. Letzte Messungen:

1904: $p = 244^{\circ}.5$, $d = 32''.6$.

Der Begleiter wurde 1878 von *Alvan Clark* in zwei Komponenten zerlegt, die sich bald ebenfalls als physisches System von kurzer Umlaufzeit (nach *See* 45 Jahre), erwiesen.

90 ($17^h 50^m + 40^{\circ} 2'$) 8235.

Von *Burnham* mit dem 6-Zöller entdeckt. Ein prächtiges Paar auch

für kleine Instrumente. Die beiden Sterne, von denen der eine 6., der andere 9. Größe ist, erfreuen besonders durch den schönen Farbenkontrast — goldgelb und blau. Das System ist wahrscheinlich physisch.

1905: $p = 123^{\circ}.7$, $d = 1''.8$.

95 ($17^h 57^m + 21^{\circ} 36'$) 8302.

Ein leicht trennbares Paar. Beide Sterne sind 4,9. Gr., der eine grünlichgelb, der andere rotgelb. Die Positionen sind relativ unverändert.

1902: $p = 260^{\circ}.2$, $d = 6''.3$.

99 ($18^h 3^m + 30^{\circ} 33'$) 8372.

Physischer Doppelstern. Der Begleiter hat etwas mehr als einen Umlauf vollendet, seitdem er im Jahre 1859 von *Alvan Clark* mit dem $8\frac{1}{4}$ -Zöller entdeckt wurde. Er ist 10,5., der Hauptstern 6. Gr. Die Umlaufszeit ergibt sich nach *Aitken* zu 63 Jahren. Gegenwärtig wird ungefähr das Maximum der Distanz mit $d = 1''.9$ in $p = 354^{\circ}$ erreicht sein.

100 ($18^h 4^m + 26^{\circ} 5'$) 8377.

Leichtes Objekt auch für kleinste Fernrohre. Das Paar ist wohl nur optisch, zeigt aber bis jetzt keine Änderung in Distanz und Positionswinkel. Beide Sterne sind 5,9. Gr.

1905: $p = 182^{\circ}.4$, $d = 14''.0$.

26. Hydra. (Die Wasserschlange.)

ε ($8^h 41^m + 6^{\circ} 47'$) 4771.

Physisches System. Hauptstern 3,8. Gr. gelb, Begleiter 7,8. Gr. blau. Die Umlaufszeit beträgt schätzungsweise 650 Jahre.

1903: $p = 234^{\circ}.5$, $d = 3''.3$.

Der hellere Stern bildet für sich wieder ein physisches Doppelsystem

mit der kurzen Periode von 15,7 Jahren. Die Distanz ist im Maximum aber nur $0''.4$.

17 ($8^h 51^m - 7^{\circ} 35'$) 4859.

Zwei Sterne 6,5. Gr. Anscheinend ein optisches Paar und bisher ohne Änderung.

1903: $p = 360^{\circ}.0$, $d = 4''.4$.

τ ($9^h 24^m - 2^o 20'$) 5110.

Hauptstern 5,5., Begleiter 8,5. Gr. Beide Sterne haben gemeinsame Eigenbewegung.

1901: $p = 3^o.5$, $d = 65''.3$.

η^3 ($10^h 49^m - 19^o 36'$) 5593.

Dreifach. A5., B9., C10. Gr. Das Paar BC wurde von Burnham mit dem 6-Zöller entdeckt. A hat eine beträchtliche Eigenbewegung, und die Änderung in AB wird durch diese verursacht.

AB 1904: $p = 210^o.3$, $d = 132^o.9$

BC 1904: $p = 132^o.1$, $d = 13^o.8$.

54 ($14^h 40^m - 25^o 1'$) 6989.

Die Komponenten dieses Doppelsystems sind relativ fest, bilden also wahrscheinlich ein physisches System, da sie gemeinsame Eigenbewegung haben. Hauptstern 5., Begleiter 7. Gr.

1890: $p = 129^o.1$, $d = 8''.7$.

59 ($14^h 53^m - 27^o 15'$) 7070.

Von Burnham mit dem 6-Zöller entdeckt. Der Positionswinkel nimmt langsam zu, während die Distanz praktisch unverändert bleibt. Beide Komponenten haben dieselbe Eigenbewegung. Helligkeit 6. Gr.

1905: $p = 321^o.7$, $d = 1''.0$.

27. Lacerta. (Die Eidechse.)

8 ($22^h 31^m + 39^o 7'$) 11839.

Vierfach. A 6,0., B 6,5., C 10,2., D 8,5. Gr. Alle Komponenten sind relativ fest zueinander. Nach Hussey gelten folgende Messungen:

AB 1902: $p = 185^o.0$, $d = 22''.4$

BC 1902: $p = 154^o.9$, $d = 28''.2$

BD 1902: $p = 131^o.2$, $d = 66''.9$.

13 ($22^h 40^m + 41^o 18'$) 11938.

Hauptstern 5,4., Begleiter 10,8. Gr. Distanz und Positionswinkel seit 1867 unverändert.

1898: $p = 129^o.3$, $d = 14''.8$.

28. Leo. (Der Löwe.)

α ($9^h 19^m + 26^o 37'$) 5062.

Von Burnham mit dem 6-Zöller entdeckt. Die bisherigen Messungen lassen keine relative Änderung erkennen. Hauptstern und Begleiter haben scheinend dieselbe Eigenbewegung.

1898: $p = 205^o.3$, $d = 3''.0$.

Helligkeiten der Komponenten: A 4,9., B 10,7. Gr.

Hauptstern ist 6,2., der Begleiter 7,0. Gr.

1903: $p = 116^o.7$, $d = 0''.8$.

6 ($9^h 27^m + 10^o 9'$) 5131.

Dieser Stern hat einen Begleiter 9. Gr. in $p = 74^o.3$, $d = 37''.1$ (1904). Die Distanz hat seit der Entdeckung des Begleiters langsam zugenommen.

α ($10^h 3^m + 12^o 27'$) 5331.

Ein bekanntes physisches Doppelsystem. Für die Umlaufzeit fand See 1895 116,2 Jahre. Der

Fast 3 Bogenminuten vom Hauptstern entfernt steht ein Begleiter 8,4. Gr., der sich gemeinsam mit *Regulus* durch den Raum bewegt.

Eine relative Änderung der Positionen geht aus den bisherigen Messungen nicht hervor.

1891: $p = 306^{\circ}.8$, $d = 176''.3$.

39 ($10^{\text{h}} 12^{\text{m}} + 23^{\circ} 37'$) 5371.

Diese Sterne bilden vermutlich ein physisches System, da sie durch gemeinsame Eigenbewegung verbunden sind. Eine relative Bewegung der beiden Komponenten ist nicht nachweisbar. Helligkeiten: A 5,8., B 11,4. Gr.

1901: $p = 299^{\circ}.1$, $d = 7''.3$.

γ ($10^{\text{h}} 14^{\text{m}} + 20^{\circ} 21'$) 5388.

Ein ausgezeichnetes Doppelsternpaar! Früher hielt man es für ein physisches System, aber *Burnham* zeigte, daß es zum 61-Cygni-Typus gehöre, da die relative Verschiebung der beiden Komponenten lediglich auf die verschiedene Eigenbewegung zurückzuführen sei.

1904: $p = 116^{\circ}.1$, $d = 3''.7$.

Helligkeiten und Farbe der Komponenten: A 2. Gr. goldgelb; B 3,5. Gr. grünlichrot.

49 ($10^{\text{h}} 30^{\text{m}} + 9^{\circ} 10'$) 5484.

Manche der älteren Messungen dieses Paares stimmen nicht gut zusammen, indessen scheint es jetzt sicher, daß die beiden Komponenten relativ fest sind, aber gemeinsame Eigenbewegung haben. Hauptstern 6. Gr. weiß, Begleiter 8,7. Gr. bläulich.

1903: $p = 156^{\circ}.3$, $d = 2''.4$.

54 ($10^{\text{h}} 50^{\text{m}} + 25^{\circ} 17'$) 5603.

Leicht zu trennendes Paar. Der Hauptstern ist 5., der Begleiter 7. Gr. Die Farbe des ersteren wird als grünlichweiß, die des letzteren als blau angegeben. Der Positionswinkel unterliegt langsamer Änderung.

1903: $p \parallel 107^{\circ}.5$, $d = 6''.4$.

χ ($11^{\text{h}} 0^{\text{m}} + 7^{\circ} 53'$) 5665.

Ein Begleiter 9. Gr. in großer Distanz vom Hauptstern.

1905: $p = 304^{\circ}.3$, $d = 281''.4$.

ϵ ($11^{\text{h}} 19^{\text{m}} + 11^{\circ} 5'$) 5765.

Ein Sternpaar mit gemeinsamer Eigenbewegung, daher wahrscheinlich physisch. Das vom Begleiter seit seiner Entdeckung zurückgelegte Bahnstück ist zu klein, als daß man die Umlaufzeit schon jetzt mit einiger Sicherheit berechnen könnte.

1903: $p = 53^{\circ}.1$, $d = 2''.6$.

Hauptstern 3,9. Gr. gelblich, Begleiter 7,1. Gr. blau.

τ ($11^{\text{h}} 23^{\text{m}} + 3^{\circ} 24'$) 5790.

Optisches Paar. Die beiden Komponenten bewegen sich rechtwinklig zueinander. Helligkeiten und Farben: A 5,0. Gr. gelb; B 7,0. Gr. weiß.

1904: $p = 174^{\circ}.2$, $d = 92''.3$.

88 ($11^{\text{h}} 27^{\text{m}} + 14^{\circ} 55'$) 5812.

Hauptstern 6,4. Gr. gelblich, Begleiter 8,4. Gr. blau. Beide Sterne haben gemeinsame Eigenbewegung.

1904: $p = 325^{\circ}.0$, $d = 15''.4$.

90 ($11^{\text{h}} 30^{\text{m}} + 17^{\circ} 22'$) 5833.

Dreifach. A 6,0., B 7,3., C 8,9. Gr. Das enge Paar AB zeigt keine Änderung, während die Distanz AC langsam wächst.

AB 1903: $p = 210^{\circ}.6$, $d = 3''.0$

AC 1898: $p = 233^{\circ}.9$, $d = 63.2$.

93 ($11^{\text{h}} 43^{\text{m}} + 20^{\circ} 46'$) 5921.

Die Komponenten dieses Paares haben gleiche Eigenbewegung. Die hellere ist 4,7., die schwächere 8,4. Gr.

1895: $p = 355^{\circ}.2$, $d = 74''.3$.

p und d seit 1868 unverändert.

29. Lepus. (Der Hase.)

ϵ ($5^h 8^m - 11^0 59'$) 2581.

Hauptstern 4,2., Begleiter 10,5. Gr. Distanz und Positionswinkel des Paares sind seit 1832 unverändert geblieben.

1899: $p = 337^0.0$, $d = 12''.7$.

κ ($5^h 9^m - 13^0 4'$) 2594.

Ein gelber Stern 5. Gr. mit einem blauen Begleiter 8. Gr. Die beiden

Sterne sind relativ fest zueinander. 1900: $p = 359^0.9$, $d = 2''.5$.

β ($5^h 24^m - 20^0 50'$) 2769.

Entdeckt von *Burnham* mit dem 6-Zöller. Der hellere Stern ist 3., der schwächere 11. Gr. Außerdem noch ein entfernter Begleiter 11,5. Gr.

AB 1898: $p = 295^0.7$, $d = 2''.7$

AC 1898: $p = 146^0.3$, $d = 65''.6$.

30. Libra. (Die Wage.)

μ ($14^h 44^m - 13^0 44'$) 7012.

Burnham sah dies enge Paar im 6-Zöller getrennt. Der Hauptstern ist 5,4., der Begleiter 6,3. Gr.; beide haben gemeinsame Eigenbewegung.

1903: $p = 342^0.6$, $d = 1''.5$.

18 ($14^h 53^m - 10^0 45'$) 7077.

Hauptstern 6., Begleiter 10,2. Gr. Ein Sternpaar ohne relative Verschiebung der Komponenten.

1901: $p = 39^0.3$, $d = 20''.0$.

31. Lynx. (Der Luchs.)

4 ($6^h 13^m + 59^0 25'$) 3277.

Ein enges Paar mit gemeinsamer Eigenbewegung. Der Positionswinkel zeigt eine geringe aber deutlich merkbare Zunahme, während die Distanz konstant bleibt. Der Hauptstern ist 6,4., der Begleiter 7,9. Gr. 1897: $p = 104^0.5$, $d = 0''.9$.

12 ($6^h 37^m + 59^0 33'$) 3559.

Dreifach: A 5,2. Gr. grünlichweiß, B 6,1. Gr. bläulich, C 7,4. Gr. Das weitere Paar AC zeigt keine merkliche Änderung; dagegen ist der physische Charakter des engen Paares AB sichergestellt. Der Positionswinkel nimmt hier ab, die Distanz bleibt unverändert. Unter der nicht unwahrscheinlichen Annahme gleichförmiger Winkelbewegung würde die Umlaufzeit nahezu 700 Jahre betragen.

AB 1903: $p = 118^0.0$, $d = 1''.6$.

AC 1903: $p = 306^0.6$, $d = 8''.4$.

19 ($7^h 15^m + 55^0 28'$) 3973.

Hauptstern 5,3. Gr. grünlichweiß, Begleiter 6,6. Gr. bläulichweiß. Beide Sterne haben dieselbe Eigenbewegung. Das Paar ist auch mit kleinen Fernrohren leicht zu trennen.

1905: $p = 313^0.9$, $d = 14''.6$.

38 ($9^h 13^m + 37^0 14'$) 5014.

Die Eigenbewegung ist beiden Komponenten dieses Paares gemeinsam, ihre gegenseitige Verschiebung unmerklich. Hauptstern 4,0 Gr. grünlichweiß, Begleiter 6,7. Gr. blau.

1903: $p = 235^0.5$, $d = 2''.9$.

37 ($9^h 14^m + 51^0 41'$) 5023.

Von anderen auch zum Sternbild *ursa major* gerechnet. Das Paar ist relativ fest, und die Eigenbewegung des helleren Sterns kommt auch dem schwächeren zu.

1898: $p = 121^0.3$, $d = 5''.8$.

32. Lyra. (Die Leier.)

α ($18^h 34^m + 38^o 41'$) 8692.

Der schwache Begleiter 10. Gr. ist nur optisch mit Wega verbunden. Infolge der beträchtlichen Eigenbewegung des hellen Sternes entfernt er sich ziemlich rasch von diesem.

1905: $p = 163^o.5$, $d = 53''.4$.

ϵ^1 ($18^h 41^m + 39^o 34'$) 8783.

Wahrscheinlich ein physisches System. Der Winkel nimmt langsam ab, während die Distanz unverändert bleibt. Hauptstern 4,6. Gr. grünlich, Begleiter 6,3. Gr. bläulich.

1903: $p = 12^o.4$, $d = 3''.2$.

ϵ^2 ($18^h 41^m + 39^o 30'$) 8785.

Ein ähnliches System wie ϵ^1 . Auch hier nimmt der Positionswinkel ab, während die Distanz konstant bleibt.

1903: $p = 126^o.7$, $d = 2''.4$.

Der Hauptstern ist 4,9., der Begleiter 5,2. Gr. — Zwischen ϵ^1 und ϵ^2 mehrere schwache Sternchen, das hellste 10. Gr.

ζ ($18^h 41^m + 37^o 30'$) 3788.

Hauptstern 4,2. Begleiter 5,5. Gr. Infolge der weiten Distanz leicht

zu trennen. Distanz und Positionswinkel zeigen keinerlei Änderung.

1904: $p = 150^o.4$, $d = 43''.7$.

β ($18^h 46^m + 33^o 15'$) 8868.

Vierfach: A var. $\bar{B}$ 6,7., E 9,2., F 9,0. Gr. Die Messungen zeigen keine Spur von relativen Verschiebungen der Sterne, so daß sie wahrscheinlich alle dieselbe Eigenbewegung haben.

AB 1899: $p = 148^o.6$, $d = 46''.0$.

AE 1898: $p = 317^o.8$, $d = 67''.2$.

AF 1898: $p = 19^o.0$, $d = 86''.3$.

Zwei weitere sehr schwache Sternchen C und D sind nur in den größten Fernrohren sichtbar.

17 ($19^h 4^m + 32^o 21'$) 9053.

Hauptstern 5,7., Begleiter 9,8. Gr. Der Begleiter bewegt sich in derselben Richtung wie der Hauptstern, aber etwas langsamer als dieser. Das Paar gehört also zum 61 *Cygni*-Typus.

1905: $p = 315^o.0$, $d = 3''.7$.

η ($19^h 10^m + 38^o 58'$) 9144.

Der Stern hat einen Begleiter 8. Gr. in $p = 82^o.4$, $d = 28''.0$, der mit ihm fest verbunden ist.

33. Monoceros. (Das Einhorn.)

3 ($5^h 57^m - 10^o 36'$) 3116.

Von *Burnham* mit dem 6-Zöller entdeckt. Der Stern ist in einen großen schwachen Nebel eingebettet. Hauptstern und Begleiter haben dieselbe Eigenbewegung und bilden wahrscheinlich ein physisches System.

1898: $p = 356^o.1$, $d = 1''.7$.

8 ($6^h 18^m + 4^o 39'$) 3349.

Leicht zu trennendes Paar. Hauptstern 4. Gr. gelblich, Begleiter 6,7. Gr. bläulich.

1867: $p = 26^o.8$, $d = 13''.7$.

11 ($6^h 24^m - 6^o 58'$) 3402.

Ein dreifaches System mit gemeinsamer Eigenbewegung. A 5. B 5,5. C 6. Gr.

AB 1903: $p = 131^o.6$, $d = 7''.3$.

BC 1903: $p = 105^o.7$, $d = 2''.8$.

15S ($6^h 35^m + 9^0 59'$) 3542.

Vielfacher Stern. Sechs Begleiter stehen im Umkreis von $2\frac{1}{2}$ Bogenminuten. Der hellste unter ihnen (9. Gr.) in $p = 216^0.6$, $d = 2''.9$. Die anderen sind 9. bis 11. Gr.

29 ($8^h 4^m - 2^0 42'$) 4456.

Der Stern hat zwei Begleiter: B 11,7, C 8,5 Gr. Beide sind relativ

zum Hauptstern in Ruhe. *Burnham* gibt folgende Messungen:

AB 1905: $p = 105^0.1$, $d = 31''.9$.

AC 1905: $p = 245^0.3$, $d = 66^0.1$.

31 ($8^h 39^m - 6^0 52'$) 4746.

Webb nennt den Hauptstern dieses Paares schön gelb, den Begleiter wundervoll blau. Die beiden Sterne sind 6. und 9. Gr.

1903: $p = 309^0.1$, $d = 78''.4$.

34. Ophiuchus. (Der Schlangenträger.)

5 ($16^h 20^m - 23^0 13'$) 7613.

Vierfach. A 5,5., B 5,8., C 8,0., D 8,0. Gr. Das enge Paar AB zeigt eine geringe Veränderung in den Positionen der Komponenten.

AB 1903: $p = 353^0.2$, $d = 3''.4$

AC 1890: $p = 360^0.6$, $d = 151^0.2$

AD 1898: $p = 253^0.3$, $d = 156^0.3$

λ ($16^h 26^m + 2^0 12'$) 7649.

Ein physisches Doppelsternsystem mit langer Umlaufszeit. Der Begleiter hat seit der Entdeckung erst einen Bogen von etwa 100^0 zurückgelegt; seine Bahn ist deshalb noch ganz unbestimmt. Z. B. findet *Mädler* für die Umlaufszeit 89 Jahre, *Glaserapp* berechnet sie zu 373 Jahren. — *Burnham* gibt folgende Messungen:

1905: $p = 59^0.8$, $d = 1''.2$.

Hauptstern 4. Gr. gelb, Begleiter 6. Gr. blau.

19 ($16^h 42^m + 2^0 15'$) 7758.

Zwei Sterne mit gemeinsamer Eigenbewegung, der hellere 6., der schwächere 9,3. Gr. Ohne gegenseitige Stellungsänderung.

1904: $p = 90^0.9$, $d = 22''.6$.

21 ($16^h 46^m + 1^0 23'$) 7777.

Ein enges Paar. Der Hauptstern 6,2. Gr. hat einen Begleiter 8,1. Gr.

in $p = 158^0.9$, $d = 0''.8$ (1903). Die Komponenten haben gemeinsame Eigenbewegung; dabei ist der Positionswinkel in langsamer Abnahme begriffen.

36 ($17^h 9^m - 26^0 27'$) 7905.

Ein System von 61 *Cygni*-Typus; die Komponenten haben eine große und nahezu gleiche Eigenbewegung. Beide sind 6. Gr.

1905: $p = 190^0.0$, $d = 4''.2$.

39 ($17^h 12^m - 24^0 11'$) 7928.

Schönes und ziemlich leicht zu trennendes Paar, bestehend aus einem roten Stern 5,4, und einem blauen Stern 6,6. Gr. Distanz und Positionswinkel sind wahrscheinlich fest.

1904: $p = 356^0.2$, $d = 10''.6$.

53 ($17^h 30^m + 9^0 39'$) 8067.

Ebenfalls ein leichtes Beobachtungsobjekt. Die beiden Komponenten sind 5,6. und 7,3. Gr. *Burnham* gibt folgende Messungen:

1905: $p = 191^0.2$, $d = 41''.1$.

61 ($17^h 40^m + 2^0 37'$) 8136.

Hauptstern 5,5., Begleiter 5,7. Gr. Die Komponenten des Paares sind relativ unbewegt.

1902: $p = 93^0.5$, $d = 20''.6$.

τ ($17^h 58^m - 8^{\circ} 11'$) 8303.

Physisches System. Mehrere Rechner haben versucht, die Bahn des Begleiters zu bestimmen, aber die Ergebnisse passen schlecht zusammen, da der Begleiter seit *Struve* erst einen Bogen von 70° in seiner Bahn zurückgelegt hat. — *Burnham* gibt folgende Messungen:

1905: $p = 258^{\circ}.7$, $d = 2''.0$.

Der Hauptstern ist 5,0., der Begleiter 5,7. Gr. $100''$ vom Hauptstern entfernt noch ein schwacher Begleiter 9,5. Größe in $p = 126^{\circ}.8$.

70 ($18^h 0^m + 2^{\circ} 31'$) 8340.

Ebenfalls ein physisches System. Da der Begleiter seit den ersten Messungen durch *Struve* schon weit mehr als einen ganzen Umlauf ausgeführt hat, sind die Bahnelemente gut bekannt. Die Umlaufszeit beträgt nach *Burnham* 87,75 Jahre.

Das Paar ist in keiner Stellung des Begleiters ein allzu schwieriges Objekt, die Distanz im Maximum $6''.7$, im Minimum $1''.5$; gegenwärtig dürfte sie etwa $6''$ betragen in $p = 130^{\circ}$. Der Hauptstern ist 4,1., der Begleiter 6,1. Gr. Die Farben werden als gelb bzw. purpur bezeichnet.

35. Orion.

14 ($5^h 2^m + 8^{\circ} 22'$) 2535.

Physisches System. Die Änderung erfolgt einstweilen vorwiegend im Positionswinkel. Der Hauptstern ist 6,0., der Begleiter 6,8. Gr.

1903: $p = 170^{\circ}.3$, $d = 0''.9$.

ϵ ($5^h 8^m + 2^{\circ} 45'$) 2584.

Hauptstern 4,7. Gr. tiefgelb, Begleiter 8,5. Gr. blau. Eine Änderung in Distanz und Positionswinkel findet nicht statt.

1903: $p = 63^{\circ}.0$, $d = 6''.9$.

β ($5^h 10^m - 8^{\circ} 19'$) 2605.

Der Begleiter dieses hellen Sternes ist 8. Gr. und im 6-Zöller sicher erkennbar. Da er trotz der beträchtlichen Eigenbewegung Rigels eine feste Stellung zu diesem beibehält, müssen sich beide Sterne gemeinsam durch den Raum bewegen, also ein physisches System bilden.

1898: $p = 201^{\circ}.4$, $d = 9''.5$.

Der Begleiter ist selbst wieder doppelt, bildet aber selbst für die größten Refraktoren ein äußerst

schwieriges Objekt, weil die Distanz wahrscheinlich stets unter $0''.2$ bleibt.

23 ($5^h 18^m + 3^{\circ} 27'$) 2692.

Hauptstern 5,0., Begleiter 7,0. Gr. Distanz und Positionswinkel im wesentlichen konstant.

1889: $p = 28^{\circ}.5$, $d = 31''.8$.

η ($5^h 19^m - 2^{\circ} 29'$) 2712.

Von *Darwes* mit einem $4\frac{1}{4}$ -Zöller entdeckt. Der hellere Stern ist 4., der Begleiter 5. Gr. Winkel und Distanz lassen keine Änderung erkennen.

1903: $p = 83^{\circ}.1$, $d = 1''.0$.

ψ ($5^h 22^m + 3^{\circ} 1'$) 2735.

Der Stern hat einen Begleiter 9. Gr., der bisher keine Veränderung der Distanz oder des Positionswinkels erkennen läßt.

1899: $p = 323^{\circ}.4$, $d = 2''.8$.

31 ($5^h 25^m - 1^{\circ} 10'$) 2775.

Die Komponenten dieses Paares sind relativ fest. A 5,8., B 11. Gr.

1887: $p = 88^{\circ}.0$, $d = 12''.5$.

33 ($5^h 26^m + 3^o 13'$) 2783.

Ein Stern 6. Gr. mit einem Begleiter 7,3. Gr., der dieselbe Eigenbewegung hat wie der Hauptstern, seine Lage gegenüber diesem aber nicht ändert.

1903: $p = 26^o.9$, $d = 1''.9$.

δ ($5^h 27^m - 0^o 22'$) 2796.

Ein optischer Begleiter dieses Sterns steht in $p = 359^o.3$, $d = 52''.6$. (1898.) *Struve* bezeichnet ihn als 6,8. Gr. Etwas näher beim Hauptstern ein ebenfalls optischer Begleiter 13. Gr., von *Burnham* entdeckt.

λ ($5^h 30^m + 9^o 52'$) 2821.

Dreifacher Stern; die Komponenten sind durch gemeinsame Eigenbewegung verbunden. A 4,0., B 6,0., C 11. Gr.

AB 1888: $p = 44^o.0$, $d = 4''.4$.

AC 1905: $p = 182^o.6$, $d = 28^o.3$.

ρ^1 ($5^h 30^m - 5^o 27'$) 2837.

Das bekannte Trapez im großen Orion-Nebel. Die vier Hauptsterne sind schon in ganz kleinen Fernrohren sichtbar, der schwächste von ihnen ist veränderlich. Ein fünfter Stern, E , wurde 1826 von *Struve*, ein sechster, F , vier Jahre später von *Herschel* entdeckt. *Burnham* sah diese 6 Sterne unter günstigen Bedingungen schon mit einem $3\frac{3}{4}$ -zölligen Refraktor, während er sie zu anderen Zeiten nicht einmal im Gesichtsfelde des 6-Zöllers und größerer Instrumente erkennen konnte. Der Grund dafür ist lediglich die wechselnde Durchsichtigkeit der Atmosphäre. Nach *Burnham* gelten folgende Messungen:

AB 1888: $p = 32^o.3$, $d = 8''.7$.

AC 1888: $p = 131^o.3$, $d = 12^o.9$.

AD 1888: $p = 95^o.4$, $d = 21^o.5$.

AE 1888: $p = 351^o.5$, $d = 4^o.3$.

BC 1888: $p = 163^o.0$, $d = 16^o.8$.

DB 1888: $p = 299^o.5$, $d = 19^o.4$.

DC 1888: $p = 241^o.3$, $d = 13''.3$.

CF 1888: $p = 120^o.9$, $d = 4^o.0$.
 A 7,0., B 8,0., C 4,7., D 6,3., E 11,3., F 10,8. Gr. Später entdeckten *Clark* und *Barnard*, dieser mit dem 36-zölligen *Lick*-Refraktor, jener mit dem 40-Zöller des *Yerkes*-Observatoriums noch zwei äußerst schwache Sterne, die *Burnham* vermessen hat. Der eine davon ist doppelt. — Die übrigen, ziemlich zahlreichen Meldungen über Entdeckungen weiterer Trapezsterne haben sich bei der Nachprüfung mit den kraftvollsten Fernrohren der Gegenwart, dem *Lick*- und dem *Yerkes*-Refraktor, sämtlich als irrtümlich erwiesen.

ρ^2 ($5^h 30^m - 5^o 29'$) 2839.

Hauptstern 4,8., Begleiter 6,1. Gr. Distanz und Positionswinkel lassen keine Änderung erkennen.

1905: $p = 92^o.7$, $d = 52''.3$.

ι ($5^h 31^m - 5^o 59'$) 2843.

Der Begleiter dieses Sternes ist 7,3. Gr. Er hat seit *Struves* Messungen seine Stellung zum Hauptstern unveränderlich beibehalten.

1903: $p = 141^o.7$, $d = 11''.5$.

α ($5^h 34^m - 2^o 39'$) 2883.

Fünffach: A 4,0., B 6,0., C 10,3., D 7,5., E 6,3. Gr. Das enge Paar AB wurde von *Burnham* mit dem 12-Zöller entdeckt, es erwies sich später als physisches System. Die Distanz scheint im Maximum $2''.5$ nicht zu übersteigen. Die anderen Komponenten lassen keine relative Ortsveränderung erkennen, sie haben daher wahrscheinlich dieselbe Eigenbewegung.

AB 1901: $p = 329^o.1$, $d = 0''.2$.

$ABu.C$ 1899: $p = 237^o.4$, $d = 11^o.3$.

$ABu.D$ 1899: $p = 82^o.8$, $d = 12^o.8$.

$ABu.E$ 1899: $p = 60^o.9$, $d = 41^o.4$.

ED 1871: $p = 230^o.9$, $d = 30^o.1$.

5 (5^h 36^m — 2° 0') 2902.

Zwei Begleiter. *B* 5,7. Gr. rötlich oliv, *C* 9. Gr. Keiner von beiden zeigt eine Ortsveränderung relativ zum Hauptstern.

AB 1903: $p = 156^{\circ}.3$, $d = 2''.4$.

AC 1903: $p = 9^{\circ}.0$, $d = 57''.7$.

52 (5^h 43^m + 6° 25') 2976.

Die Komponenten dieses Paares sind beide gleichhell, nämlich 6,2 Gr.

Der Positionswinkel scheint langsam zuzunehmen.

1903: $p = 207^{\circ}.3$, $d = 1''.5$.

75 (6^h 12^m + 9° 59') 3271.

Vierfach. *A* 6,0., *B* 10,2., *C* 9,0., *D* 11,5. Gr. Der schwache Doppelbegleiter *CD* wurde von *Burnham* mit dem 6-Zöller aufgefunden.

CD 1898: $p = 224^{\circ}.3$, $d = 4''.8$.

AC 1898: $p = 159^{\circ}.2$, $d = 119''.3$.

AB 1898: $p = 256^{\circ}.0$, $d = 62''.8$.

36. Pegasus.

1 (21^h 17^m + 19° 23') 10932.

Ein Stern 4,5. Gr. mit einem Begleiter 8,6. Gr. in $p = 311^{\circ}.2$, $d = 35''.8$ (1905), der anscheinend keine Änderung in Distanz und Positionswinkel erleidet.

3 (21^h 33^m + 6° 10') 11103.

Hauptstern 6,0., Begleiter 7,4. Gr. Eine relative Änderung in den Positionen der beiden Komponenten hat sich noch nicht gezeigt.

1899: $p = 349^{\circ}.4$, $d = 39''.3$.

2 (21^h 40^m + 25° 11') 11222.

Ein schwacher Begleiter 10,8. Gr. steht in $p = 298^{\circ}.8$, $d = 12''.4$ (1898). Der Begleiter bildet seinerseits einen sehr engen Doppelstern mit der kurzen Umlaufszeit von 11 Jahren. Nur für große Instrumente geeignet, da die Distanz niemals größer wird als 0''.3.

33 (22^h 19^m + 20° 21') 11690.

Dreifach: *A* 6,0., *B* 9,2., *C* 7,9. Gr. Die Änderung der Positionen in dem engen Paar *AB* betrifft nur die Distanz. Die beiden Sterne haben gemeinsame Eigenbewegung und bilden wahrscheinlich ein physisches System. Der entfernte Begleiter *C*

bewegt sich vollkommen geradlinig bei wachsender Distanz.

AB 1904: $p = 180^{\circ}.4$, $d = 1''.5$.

AC 1905: $p = 323^{\circ}.6$, $d = 67''.6$.

52 (22^h 54^m + 11° 12') 12094.

Ein Doppelsternsystem mit langer Umlaufszeit. Distanz und Positionswinkel ändern sich nur langsam, erstere nimmt gegenwärtig ab, letztere dagegen wächst. Der Hauptstern ist 6,2., der Begleiter 7,7. Gr.

1903: $p = 226^{\circ}.9$, $d = 0''.9$.

57 (23^h 4^m + 8° 8') 12188.

Der Hauptstern dieses Paares ist 5,9., der Begleiter 10,5. Gr. *Herschel* bezeichnet den einen als gelb, den anderen als schön blau. Eine Verschiebung der Komponenten läßt sich bis jetzt nicht erkennen.

1904: $p = 198^{\circ}.3$, $d = 32''.9$.

85 (23^h 57^m + 26° 34') 12701.

Ein optisches Paar. Der Hauptstern ist 6,0., der Begleiter 8,5. Gr. Infolge der Eigenbewegung des helleren Sternes wird die Distanz immer größer, wobei sich der Begleiter in gerader Linie zu bewegen scheint.

1905: $p = 339^{\circ}.2$, $d = 41''.5$.

Der Hauptstern stellt seinerseits ein physisches System dar, das wegen

der geringen Distanz der Komponenten schwierig zu beobachten ist.

37. Perseus.

θ ($2^h 37^m + 48^\circ 48'$) 1339.

Dreifach. $A 4,2$, $B 10$, $C 10$. Gr. Die Bewegung der Komponenten ist geradlinig und durch die Eigenbewegung des helleren Sternes verursacht.

AB 1903: $p = 299^0.6$, $d = 17''.3$.

AC 1903: $p = 224 .6$, $d = 73 .2$.

Bei beiden Paaren nehmen Distanz und Positionswinkel zu.

η ($2^h 43^m + 55^\circ 29'$) 1440.

Mehrfach: $A 4,0$, $B 8,5$, $C 10$. Gr. In AB keine Änderung. C hat einen schwachen Begleiter $10,5$. Gr., c , den *J. W. Ward* zuerst mit einer Öffnung von $4,3$ Zoll erkannte. Im Gesichtsfeld noch einige schwache Sterne, einer davon in $d = 58''$, ein anderer in $d = 237''$.

AB 1904: $p = 300^0.9$, $d = 28''.1$.

AC 1904: $p = 268 .8$, $d = 66 .8$.

Cc 1904: $p = 114 .0$, $d = 5 .3$.

20 ($2^h 47^m + 37^\circ 56'$) 1471:

Hauptstern $5,5$, Begleiter $10,0$. Gr. Die Positionen sind relativ konstant. Der Begleiter wurde von *Burnham* am $18\frac{1}{2}$ -Zöller als sehr enges physisches System erkannt; die Distanz des Paares wird niemals größer als $0''.3$.

AB u. C 1898: $p = 237^0.5$, $d = 13''.9$.

40 ($3^h 36^m + 33^\circ 39'$) 1818.

Ein Stern $4,2$. mit einem Begleiter $9,5$. Gr. Die beiden Komponenten bilden ein relativ unbewegliches Paar.

1903: $p = 237^0.7$, $d = 19''.8$.

ζ ($3^h 48^m + 31^\circ 35'$) 1921.

Dieser Stern hat vier schwache Begleiter: $B 9,3$, $C 11,1$, $D 9,3$, $E 10,0$ Gr. Keiner davon läßt eine Änderung der Distanz oder des Positionswinkels erkennen.

AB 1903: $p = 208^0.6$, $d = 12''.6$.

AC 1903: $p = 287 .0$, $d = 32 .6$.

AD 1903: $p = 197 .7$, $d = 90 .4$.

AE 1903: $p = 184 .8$, $d = 119 .5$.

ε ($3^h 51^m + 39^\circ 43'$) 1950.

Hauptstern $3,1$. Gr. grün, Begleiter $8,3$. Gr. bläulichweiß. Distanz und Positionswinkel sind ohne Änderung.

1904: $p = 10^0.8$, $d = 8''.6$.

56 ($4^h 18^m + 33^\circ 44'$) 2163.

Vermutlich ein physisches Paar. Die beiden Komponenten haben gemeinsame Eigenbewegung und ändern dabei langsam ihre gegenseitige Stellung.

1898: $p = 41^0.9$, $d = 4''.6$.

38. Pisces. (Die Fische.)

34 ($0^h 5^m + 10^\circ 35'$) 38.

Ein Stern 6 . mit einem Begleiter $10,5$. Gr., den *Herschel* als blau bezeichnet. Die relativen Positionen der Komponenten sind wahrscheinlich ohne Änderung.

1903: $p = 159^0.9$, $d = 7''.8$.

35 ($0^h 10^m + 8^\circ 16'$) 87.

Leicht zu trennendes Paar. Der Hauptstern ist $6,2$, der Begleiter $7,8$. Gr.

1904: $p = 148^0.3$, $d = 11''.4$.

42 ($0^h 17^m + 12^o 56'$) 165.

Ein optisches Paar. Die Änderung im Winkel und in der Distanz rührt von der Eigenbewegung des helleren Sternes her. Dieser ist 6,8., der Begleiter 10,7. Gr. *Herschel* nennt den einen gelb, den anderen blaugrün.

1904: $p = 332^o.8$, $d = 28''.8$.

51 ($0^h 27^m + 6^o 24'$) 274.

Hauptstern 5., Begleiter 9. Gr. Positionswinkel und Distanz ohne Änderung.

1893: $p = 82^o.2$, $d = 27''.7$.

55 ($0^h 35^m + 20^o 53'$) 360.

Zwei Sterne mit gemeinsamer Eigenbewegung; der hellere 5,0., der schwächere 8,2. Gr. Der Hauptstern ist gelb, der Begleiter nach *Dembowski* tiefrot, nach anderen blau oder purpur.

1903: $p = 191^o.7$, $d = 6''.8$.

65 ($0^h 44^m + 27^o 10'$) 439.

Die Messungen stimmen für ein so leicht zu beobachtendes Paar wie dieses wenig befriedigend zusammen. Im ganzen scheint keine Änderung der Positionen daraus hervorzugehen. Beide Komponenten sind 6. Gr.

1897: $p = 297^o.2$, $d = 4''.4$.

ψ^1 ($1^h 0^m + 20^o 56'$) 570.

Zwei Sterne 5. Gr. in $p = 160^o.2$, $d = 30''.0$ (1903). Die Komponenten scheinen sich ohne Änderung der gegenseitigen Stellung durch den Raum zu bewegen.

φ ($1^h 8^m + 24^o 3'$) 647.

Die Messungen an diesem Paare stimmen nicht ganz überein, eine Änderung der Positionen läßt sich aber aus ihnen trotzdem nicht mit Sicherheit ableiten.

1904: $p = 227^o.5$, $d = 7''.7$.

Hauptstern 4,7. Begleiter 10,1. Gr.

ζ ($1^h 9^m + 7^o 3'$) 648.

Ein leicht zu beobachtendes Paar. Der Hauptstern ist 4,2, der Begleiter 5,3. Gr. Der schwächere Stern ist wiederum doppelt; er hat einen Begleiter 11. Gr. in geringer Distanz ($d < 1''$). Alle drei Komponenten bilden wahrscheinlich ein weites physisches System.

1898: $p = 63^o.5$, $d = 23''.7$.

Ohne Änderung.

α ($1^h 57^m + 2^o 17'$) 1061.

Wahrscheinlich ein physisches System mit sehr langer Umlaufzeit. Hauptstern 2,8. Gr. grünlich-weiß, Begleiter 3,9. Gr. blau.

1901: $p = 318^o.7$, $d = 2''.6$.

Beide abnehmend.

39. Sagittarius. (Der Schütze.)

21 ($18^h 19^m - 20^o 36'$) 8529.

Entdeckt von *Alvan Clark*, aber schon 1846 von *Jacob* gesehen und vermessen. Hauptstern 5. Gr. gelb, Begleiter 8,5. Gr. blau.

1900: $p = 292^o.4$, $d = 1''.8$.

54 ($19^h 35^m - 16^o 31'$) 9496.

Dreifach: *A* 5. Gr. gelb, *B* 11,5. Gr. *C* 9. Gr. opalblau. Die Farben nach *Herschel*.

AB 1903: $p = 274^o.0$, $d = 37''.9$

AC 1903: $p = 42^o.0$, $d = 45''.6$.

40. Scorpius. (Der Skorpion.)

2 ($15^h 48^m - 25^0 2'$) 7418.

Von *Burnham* mit dem 6-Zöller entdeckt. Die relative Änderung der Positionen ist unmerklich klein, aber es handelt sich trotzdem wahrscheinlich um ein physisches System, da die Komponenten gemeinsame Eigenbewegung haben.

1898: $p = 275^0.5$, $d = 2''.9$.

Hauptstern 6. Begleiter 8. Gr.

ξ ($15^h 59^m - 11^0 6'$) 7487.

Ein sehr bemerkenswertes dreifaches System. Das enge Paar *AB* hat eine Umlaufszeit von wenig mehr als 44 Jahre. Die Distanz ist im Maximum $1''.3$, die Komponenten sind 4,9. und 5,2. Gr. Viel leichter zu beobachten ist der dritte Stern *C* (7,2. Gr.), der ebenfalls als physischer Begleiter dem System angehört. Für ihn gelten die Messungen:

1903: $p = 63^0.2$, $d = 7''.3$.

p abnehmend, d konstant.

β ($16^h 0^m - 19^0 32'$) 7493.

Dieser helle Stern hat einen Begleiter 6. Gr. in $p = 25^0.1$, $d = 13''.3$. (1901.) Da beide Komponenten gemeinsame Eigenbewegung haben, ist das System wahrscheinlich physisch. Der Hauptstern hat außerdem

noch einen sehr nahen Begleiter 11. Gr., der im $18\frac{1}{2}$ -Zöller entdeckt wurde.

11 ($16^h 2^m - 12^0 29'$) 7502.

Entdeckt von *Burnham* mit dem 6-Zöller. Die Messungen deuten keine relative Änderung an, aber da die Eigenbewegung beiden Komponenten gemeinsam ist, handelt es sich wohl um ein physisches System.

1899: $p = 258^0.3$, $d = 3''.3$.

Hauptstern 6,1. Begleiter 10,4. Gr.

ν ($16^h 6^m - 19^0 12'$) 7533.

Mehrfach. Das enge Paar *AB* wurde von *Burnham* mit dem 6-Zöller entdeckt, die Duplizität des *Herschel*-schen Begleiters *C* von *Mitchell*. Die Messungen des Paares *AB* zeigen keine Änderung; dasselbe gilt für *CD*. Auch in der gegenseitigen Stellung der beiden Paare machen sich keine Verschiebungen bemerkbar. Es ist daher anzunehmen, daß alle vier Sterne gemeinsame Eigenbewegung haben und ein weites, physisches System bilden.

AB 1901: $p = 365^0.5$, $d = 1''.1$

CD 1901: $p = 48^0.0$, $d = 1^0.9$

ABu.C 1901: $p = 336^0.9$, $d = 41^0.3$.

A 4,2. *B* 6,7. *C* 7,0. *D* 8,0. Gr.

41. Serpens. (Die Schlange.)

2 ($14^h 57^m + 0^0 15'$) 7096.

Von *Burnham* trotz der engen Distanz mit dem 6-Zöller entdeckt. Der Hauptstern ist 5,1. der Begleiter 7,4. Gr. Winkel und Distanz erleiden geringfügige Änderungen. Das System ist wahrscheinlich physisch.

1903: $p = 117^0.6$, $d = 0''.5$.

5 ($15^h 14^m + 2^0 9'$) 7213.

Hauptstern 5. Begleiter 10. Gr. Sehr geringe Änderung in den Positionen, aber gleiche Eigenbewegung.

1903: $p = 38^0.6$, $d = 10''.7$.

6 ($15^h 16^m + 1^0 5'$) 7222.

Im 6-Zöller sichtbar. Eine relative Ortsveränderung der Kompo-

nenten ist nicht mit Sicherheit zu erkennen; trotzdem handelt es sich um ein physisches System, da beide Komponenten dieselbe Eigenbewegung haben.

1898: $p = 14^{\circ}.5$, $d = 2''.6$.

Hauptstern 4,7. Begleiter 9,3. Gr.

δ ($15^h 30^m + 10^{\circ} 52'$) 7318.

Wahrscheinlich ein physisches System mit sehr langsamer Umlaufzeit. Die Maximaldistanz ist anscheinend schon überschritten.

1905: $p = 185^{\circ}.0$, $d = 3''.5$.

Hauptstern 3,0. Gr. gelblichweiß, Begleiter 4,0. Gr. grau.

β ($15^h 42^m + 15^{\circ} 44'$) 7386.

Festes System. Hauptstern 3,0. Begleiter 9,2. Gr.

1905: $p = 264^{\circ}.9$, $d = 30''.6$.

γ ($17^h 15^m - 12^{\circ} 45'$) 7957.

Hauptstern 5., Begleiter 9. Gr. Distanz und Positionswinkel wahrscheinlich ohne Änderung.

1903: $p = 29^{\circ}.7$, $d = 46''.9$.

59 d ($18^h 22^m + 0^{\circ} 8'$) 8582.

Hauptstern 5,5. Gr. gelb, Begleiter 7,8. Gr. blau.

1904: $p = 317^{\circ}.6$, $d = 3''.7$.

p und d sind konstant.

θ ($18^h 51^m + 4^{\circ} 4'$) 8914.

Wahrscheinlich ein physisches System. Geringe Zunahme der Distanz bei gemeinsamer Eigenbewegung. Beide Sterne sind 4. Gr.

1902: $p = 104^{\circ}.3$, $d = 22''.2$.

Leichtes Beobachtungsobjekt auch für sehr kleine Öffnungen.

42. Sextans. (Der Sextant.)

8 ($9^h 48^m - 7^{\circ} 38'$) 5235.

Ein sehr enges Paar, das aber nichtsdestoweniger von *Clark* mit einem $4\frac{3}{4}$ -Zöller entdeckt wurde. Die Sterne bilden ein physisches System, für das *Glazenapp* eine Umlaufzeit von 93 Jahren berechnet

hat. Beide Sterne sind 5,5. Gr. 1903: $p = 85^{\circ}.7$, $d = 0''.5$.

35 ($10^h 38^m + 5^{\circ} 16'$) 5539.

Hauptstern 6,1. Gr. gelb, Begleiter 7,2. Gr. blau. Distanz und Positionswinkel ohne Änderung.

1889: $p = 240^{\circ}.2$, $d = 6''.6$.

43. Taurus. (Der Stier.)

7 ($3^h 29^m + 24^{\circ} 8'$) 1761.

Optisch. Die Änderungen im Winkel und in der Distanz lassen sich durch die Eigenbewegung des helleren Sternes befriedigend erklären.

Hauptstern 6. Begleiter 10. Gr.

1904: $p = 59^{\circ}.1$, $d = 22''.1$.

Der hellere Stern besteht seinerseits aus zwei Komponenten, die ein sehr enges physisches System bilden.

30 ($3^h 43^m + 10^{\circ} 50'$) 1886.

Hauptstern 4,5. Begleiter 9,6. Gr. Distanz und Positionswinkel sind bisher ungeändert geblieben.

1904: $p = 60^{\circ}.9$, $d = 8''.8$.

φ ($4^h 14^m + 27^{\circ} 7'$) 2130.

Anscheinend ein optisches Paar. Ein roter Stern 5. mit einem bläulichen Begleiter 8. Gr. Positionswinkel und Distanz ändern sich ein wenig infolge der Eigenbewegung.

1904: $p = 247^{\circ}.8$, $d = 52''.3$.

χ ($4^h 16^m + 25^0 24'$) 2147.

Hauptstern 5,7. Gr. weiß, Begleiter 7,8. Gr. bläulich. Distanz und Positionswinkel bisher ohne Änderung.

1904: $p = 24^0.9$, $d = 19''.3$.

62 ($4^h 18^m + 24^0 4'$) 2162.

Hauptstern 6,2. Begleiter 8,0. Gr. Da Positionswinkel und Distanz sich seit den ersten Messungen nicht geändert haben, muß eine gemeinsame Eigenbewegung der beiden Sterne angenommen werden.

1904: $p = 290^0.1$, $d = 28''.9$.

44. Ursa major. (Der große Bär.)

α ($9^h 2^m + 67^0 32'$) 4923.

Positionswinkel und Distanz dieses Paares haben seit 1783 beständig abgenommen. *Herschel* maß in dem genannten Jahre $p = 283^0$, $d = 7''.9$, während *Burnham* findet:

1905: $p = 190^0.1$, $d = 1''.3$.

Gegenwärtig nimmt die Distanz wieder zu. Anscheinend sind diese Änderungen auf Eigenbewegungen der Komponenten zurückzuführen, so daß es sich um ein optisches Paar handeln würde. Der Hauptstern ist 5,0. der Begleiter 8,2. Gr.

32 ($9^h 24^m + 63^0 30'$) 5104.

Hauptstern und Begleiter dieses Paares haben dieselbe Eigenbewegung. *A* 3,8. Gr. grünlichweiß, *B* 9. Gr. grau.

1900: $p = 270^0.5$, $d = 23''.0$.

ξ ($11^h 13^m + 32^0 6'$) 5734.

Ein gut bekanntes physisches System mit einer Umlaufszeit von 60 Jahren. Der Begleiter wurde 1826 zuerst gemessen, hat also seitdem bereits weit mehr als einen vollen Umlauf zurückgelegt. Für

115 ($5^h 21^m + 17^0 53'$) 2729.

Ein Stern 6. Gr. mit einem Begleiter 10,8. Gr. in $p = 307^0.4$, $d = 10''.4$ (1898). Distanz und Winkel wahrscheinlich ohne Änderung.

118 ($5^h 23^m + 25^0 4'$) 2751.

Hauptstern 5,8. Gr. weiß, Begleiter 6,6. Gr. bläulich. Seit *Herschels* Messungen von 1783 sind Distanz und Winkel fast ohne Änderung geblieben.

1903: $p = 201^0.7$, $d = 4''.9$.

1923 gilt ungefähr $p = 90^0$, $d = 2''$. Der Hauptstern ist 4. der Begleiter 4,9. Gr.

ν ($11^h 13^m + 33^0 38'$) 5735.

Ein Stern 3,7. Gr. mit einem Begleiter 10,1. Gr. in $p = 145^0.6$, $d = 7''.5$ (1905). Distanz und Winkel lassen keine Änderung erkennen.

57 ($11^h 24^m + 39^0 53'$) 5793.

Hauptstern 5,2. Begleiter 8,2. Gr. Spätere Beobachter geben den Positionswinkel etwas kleiner als die früheren, doch kann eine relative Bewegung der Komponenten nicht daraus gefolgert werden. Beide Sterne haben gemeinsame Eigenbewegung.

1903: $p = 2^0.2$, $d = 5''.4$.

ζ ($13^h 20^m + 55^0 27'$) 6482.

Eines der bekanntesten und mit kleinen Instrumenten am leichtesten zu beobachtenden Paare. Distanz und Positionswinkel sind durchaus konstant.

1904: $p = 149^0.7$, $d = 14''.5$.

Hauptstern 2,1. Begleiter 4,2. Gr.

45. Ursa minor. (Der kleine Bär.)

α ($1^h 23^m + 88^\circ 46'$) 713.

Der Polarstern hat einen optischen Begleiter 9. Gr. in $p = 214^\circ 0$, $d = 18'' 2$. Das Paar wird vielfach als Prüfungsobjekt für einen 2-Zöller angegeben; tatsächlich haben verschiedene Beobachter den Begleiter

schon mit kleineren Öffnungen bis herab zu 1.6 Zoll gesehen.

π^1 ($15^h 36^m + 80^\circ 47'$) 7362.

Hauptstern 6,1. Begleiter 7,0. Gr. Beide Sterne haben dieselbe Eigenbewegung und ändern ihre gegenseitige Stellung nicht.

1897: $p = 81^\circ 2$, $d = 30'' 8$.

46. Virgo. (Die Jungfrau.)

γ ($12^h 37^m - 0^\circ 54'$) 6243.

Eins der am längsten bekannten Doppelsternsysteme. Die brauchbaren Messungen beginnen mit 1825, die Umlaufszeit beträgt 194 Jahre.

1905: $p = 328^\circ 5$, $d = 6'' 2$.

Gegenwärtig befindet sich der Begleiter in der Nähe des Apastrons. Beide Sterne sind 3. Gr.

θ ($13^h 5^m - 5^\circ 0'$) 6405.

Dreifach: A 4,0. B 9,0. C 9,0. Gr. Distanzen und Positionswinkel sind konstant.

AB 1905: $p = 343^\circ 7$, $d = 6'' 8$.

AC 1905: $p = 298^\circ 6$, $d = 71'' 1$.

δ ($13^h 38^m + 4^\circ 3'$) 6599.

Hauptstern 5,8. Gr. gelb, Begleiter 8,2. Gr. tiefblau. Die Sterne haben gemeinsame Eigenbewegung bei sehr geringer Änderung des Positionswinkels.

1903: $p = 230^\circ 0$, $d = 3'' 4$.

φ ($14^h 23^m - 1^\circ 47'$) 6880.

Zwei Sterne mit gemeinsamer Eigenbewegung. Der eine ist 5,2 der andere 9,7. Gr.

1904: $p = 110^\circ 5$, $d = 4'' 7$.

Die Messungen deuten eine geringe Veränderlichkeit der Größen p und d an.

47. Vulpecula. (Das Füchschen.)

2 ($19^h 13^m + 22^\circ 51'$) 9194.

Von *Burnham* mit dem 6-Zöller entdeckt. Ein schönes Paar für mäßige Fernrohre; der Hauptstern

ist 5,7. der Begleiter 9,5. Gr. Die Messungen lassen nicht die geringste Änderung der Positionen erkennen.

1898: $p = 127^\circ 7$, $d = 2'' 0$.

Einige mit bloßem Auge zu trennende Sternpaare ($d > 3'$).

Bu.Nr.	Stern	1900		p	d	mag.		Sp.	Sp.
		A.R.	Decl.			A.	B.		
		h m	° '	° '	''				
1008	56 Andromed.	1 50	+36 46	300	187	5.8	6.0	K0	K5
2177	z Tauri	4 19	+22 4	173	340	4.4	5.3	A3	A2
2212	ø Tauri	4 23	+15 39	346	337	3.6	4.1	A5	K0
2293	σ Tauri	4 33	+15 43	193	432	4.8	5.2	A3	A2
2480	11 Camelop.	4 57	+58 50	8	180	5.4	6.1	B3	K
5368	ζ Leonis	10 11	+23 55	341	320	3.7	5.7	F2	G0
6410	17 Canum ven.	13 5	+39 2	297	286	6.0	6.2	F0	A
7018	α Librae	14 45	-15 38	314	231	2.9	5.1	A2	F5
7608	ν Coronae	16 19	+34 2	165	367	5.2	5.5	Ma	K5
7845	33 Herculis	16 59	+13 44	116	296	5.9	6.1	A0	G5
8782	ε Lyrae	18 41	+39 34	173	208	4.7	4.9	A3	A5
9350	6 Vulpeculae	19 24	+24 28	28	406	4.7	5.9	Ma	G
10036	o Cygni	20 10	+46 26	323	338	4.0	5.1	Comp.	A2
10058	α ² Capricorni	20 12	-12 51	291	376	3.8	4.6	K0	K0
10112	β Capricorni	20 15	-15 6	267	205	3.3	6.1	Comp.	A0
10782	γ Equulei	21 6	+ 9 44	153	356	4.8	6.0	F0p	A2

Bemerkungen. In vorstehender Tabelle ist eine Anzahl von Sternpaaren zusammengestellt, deren Komponenten ein scharfes Auge unter günstigen Luftverhältnissen auch ohne Fernrohr getrennt sieht. Die Angaben sind dem 56. Bande der *Harvard Annalen* entnommen. Spalte 1 gibt die Nummer des Sternes im *Burnhamschen* Generalkatalog, Spalte 2 seinen Namen und Spalte 3 seine Position für 1900. Weiterhin werden Positionswinkel und Distanz mitgeteilt, dann die Helligkeiten der beiden Komponenten und schließlich ihre Spektren.



III.

Sternhaufen und Nebel.

Das folgende Verzeichnis beruht auf dem Katalog heller Sternhaufen und Nebel von *Solon J. Bailey* und gibt, nach Sternbildern geordnet, eine Übersicht der für den Liebhaber hauptsächlich in Frage kommenden Beobachtungsobjekte dieser Art. Die Nummern in der zweiten Spalte sind diejenigen des neuen Generalkataloges von *Dreyer*, die Positionen gelten für 1900. Bei der Beschreibung der Objekte werden folgende Abkürzungen gebraucht: St.H. = Sternhaufen; N. = Nebel; $\odot$ = kugelförmiger Sternhaufen; * = Stern; h = hell; gr. = groß; kl. = klein; zml. = ziemlich; zerstr. = zerstreut; verd. = verdichtet; Aufl. = auflösbar; Dm. = Durchmesser. Besonders merkwürdige Objekte sind durch ein oder mehrere ! gekennzeichnet. Bezüglich der beigegebenen Beschreibung sei noch bemerkt, daß diese das Aussehen des betreffenden Objektes auf der photographischen Platte wiedergibt und daher für die direkte Beobachtung am Fernrohr nicht immer in allen Einzelheiten maßgebend zu sein braucht. Überhaupt befinden sich unter den angeführten Sternhaufen und Nebelflecken solche, die wegen ihrer Kleinheit nur schwer von einem gewöhnlichen Stern zu unterscheiden sind. Falls man nicht über eine Umgebungskarte verfügt, sollte man sich mit diesen erst abgeben, wenn das Auge durch längere Beschäftigung mit dem Gegenstande die nötige Übung erlangt hat.

Als Beobachtungsarbeiten kämen für den Liebhaber vor allem Farben- und Helligkeitsschätzungen von Nebeln und Haufensternen in Frage. Für die Helligkeitsschätzungen bietet sich in beiden Fällen die *Argelandersche* Stufenmethode dar; für die Farbenbeobachtungen die *Osthoffsche* Ziffernskala mit Hinzunahme bläulicher Farbtöne (—1, —2 usw.) für die Nebel. Die Ausführung im einzelnen wird sich hier jeder Beobachter nach Maßgabe seiner Mittel und der verfügbaren Zeit selbst zurechtlegen.

Sternbild	N.G.C.	1900		Beschreibung
		A. R.	Decl.	
Andromeda	221	^h 0 37.2	[°] + 40 19	Elliptischer N. Das Objekt macht den Eindruck eines verwaschenen Sternes 9. Gr.
	224	0 37.3	+ 40 43	!!! Der gr. Spiral-N. Sehr h. mit stark verd. Kern. Längenausdehnung 120'. Spektrum kontinuierlich mit Absorptionslinien.
	752	1 51.8	+ 37 11	Zerstr. St. H. Dm. 30'. Enthält etwa 40 Sterne 9. bis 11. Gr.
Aquarius	7089	21 28.3	— 1 16	! ☉ verd. Dm. 30'. Enthält 800 Sterne 13. bis 15. Gr. darunter 10 als veränderlich bekannt. Aussehen in kleineren Fernrohren wie ein verwaschener * 5. Gr.
Aquila	6724	18 52.0	+ 10 15	St. H. Sterne 9. bis 12. Gr. Gesamthelligkeit 6,7 Gr.
Anriga	1907	5 21.4	+ 35 14	St. H. verstr. Dm. 2'. Enthält 15 Sterne 10. bis 13. Gr. Aussehen in kleinen Fernrohren wie ein verwaschener * 9. Gr.
	1912	5 22.0	+ 35 45	Unregelmäßiger verstr. St.H. Dm. 15'. Enthält etwa 50 Sterne 10. bis 12. Gr.
	1960	5 29.5	+ 34 4	! St.H. zieml. verd. Dm. 15'. Enthält etwa 50 Sterne 8. bis 12. Gr.
	2099	5 45.8	+ 32 31	! Regelmäßiger, fast kugeliger St.H. zieml. verd. Schon in kl. Fernrohren aufl. Dm. 25'. Enthält 200 Sterne 10. bis 12. Gr.
	2281	6 42.3	+ 41 10	St.H. verstr. Dm. 15'. Enthält circa 20 Sterne 8. bis 11. Gr.
Camelopardalis	2403	7 27.2	+ 65 49	Schwacher N. zwischen zwei Sternen.
Cancer	2632	8 34.3	+ 20 20	St.H. grob zerstr. Eine unter dem Namen <i>Praesepe</i> = Krippe bekannte Gruppe verhältnismäßig heller Sterne. Dm. 60'. Zahl der Sterne etwa 50.
	2682	8 45.8	+ 12 11	Schwacher, zieml. verd. St.H. Dm. 15'. Enthält etwa 15 Sterne 9. bis 13. Gr.
Canes ven.	4214	12 10.6	+ 36 53	Schwacher, länglicher N. mit hellerem Kern. 2' lang, 0'5 breit; spiralig?
	4258	12 14.0	+ 47 52	Kl. zieml. länglicher N. mit h. Kern.
	4449	12 23.4	+ 44 39	Länglicher N. mit hellerem Zentrum. 1'5 lang, 0'3 breit.
	4490	12 25.8	+ 42 12	Elliptischer N., heller im Zentrum. 1'0 lang, 0'3 breit.
	4631	12 37.3	+ 33 6	Langgestreckter N. (6' × 1') mit mehreren Kernen. Am Nordrande einige schwach. Sterne.
	4656	12 39.1	+ 32 43	Langgestreckter, unregelmäßiger N. mit mehreren Kernen.
	4736	12 46.2	+ 41 40	Zieml. runder N., im Zentrum etwas heller; zweifelhaft, ob Spiral-N. oder ☉, Gesamthelligkeit wie ein * 7. Gr. Dm. 0'5.

Sternbild	N.G.C.	1900		Beschreibung
		A. R.	Decl.	
		h m	o ' "	
Canes ven.	5005	13 6.3	+ 37 36	Länglicher N. mit Kern.
	5055	13 11.3	+ 42 34	Elliptischer N. mit Kern. Dm. 1'.
	5194	13 25.7	+ 47 43	Spiral-N. mit Kern. Dm. 5'.
	5272	13 37.6	+ 28 53	!! ☉ bestehend aus mehr als 5000 Sternen. 132 davon sind als veränderlich bekannt. Die Sterne erscheinen in zwei Gruppen geteilt, von denen die eine die Objekte 13. bis 15. Gr., die andere sehr schwache Sterne unterhalb der 17. Gr. umfaßt. Der Haufen ist in kl. Fernrohren nicht aufl. und erscheint dann als verwaschener * 4. Gr.
Canis major	2287	6 42.7	— 20 38	Zerstr. St.H. Dm. 30'. Besteht aus 25 Sternen 8. bis 11. Gr.
	2360	7 13.2	— 15 27	Ziemi. verd. etwas neblig aussehender St.H. Dm. 10'. Enthält etwa 40 Sterne 10. bis 14. Gr.
Cassiopeia	7654	23 19.8	+ 61 3	Ziemi. verd. St.H. Dm. 12'. 50 Sterne 9. bis 13. Gr.
	7789	23 52.0	+ 56 10	Ziemi. verd. St.H. Dm. 10'. 40 Sterne 10. bis 12. Gr.
	457	1 12.8	+ 57 48	Zerstr. St.H. Dm. 10'. 15 Sterne 8. bis 11. Gr.
	581	1 26.6	+ 60 11	Zerstr. St.H. Dm. 5'. 15 Sterne 9. bis 11. Gr. Der Haufen enthält einen hellen Stern, <i>B. D.</i> + 59° 271, dessen photometrische Größe zu 7.26 angegeben wird.
	654	1 37.2	+ 61 23	Zerstr. St.H. Dm. 4'. 10 Sterne 10 bis 12 Gr.
	659	1 37.4	+ 60 12	Zerstr. St.H. Dm. 4'. 10 Sterne 10. bis 14. Gr.
	663	1 39.2	+ 60 44	Zerstr. St.H. Dm. 15'. 25 Sterne 10. bis 13. Gr.
				Rundlicher kleiner N. Spiralig? Dm. 0'.6.
Coma Ber.	4254	12 13.8	+ 14 58	Kl. schwacher, etwas länglicher N. mit hellerem Kern. Dm. 0'.3.
	4321	12 17.9	+ 16 23	Schwacher, runder N., heller im Zentrum. Dm. 1'.1.
	4382	12 20.4	+ 18 45	Länglicher N. (1'.5 × 0'.6) mit Kern.
	4450	12 23.4	+ 17 38	Schwacher, etwas länglicher N. Länge 3'.0, Breite 1'.5, mit hellerem Kern.
	4501	12 26.9	+ 14 58	Kl. schwacher N., doppelt so lang wie breit.
	4651	12 38.7	+ 16 56	Länglicher N. mit h. Kern.
	4826	12 51.8	+ 22 13	! ☉ ziemi. verd. Dm. 5'. Enthält 350 Sterne 13. bis 14. Gr.
	5024	13 8.0	+ 18 42	In kl. Fernrohren nicht aufl., sondern wie ein verwaschener * 5. Gr.
Cygnus	6811	19 35.2	+ 46 20	Zerstr. St.H. Dm. 10'. 20 Sterne 10. bis 12. Gr.
	6866	20 0.5	+ 43 43	Zerstr. St.H. Dm. 5'. Wenige Sterne 8. bis 12. Gr.

Sternbild	N.G.C.	1900		Beschreibung
		A. R.	Decl.	
		h m	° '	
Cygnus	7092	21 28.6	+ 48 0	Zerstr. St.H. Dm. 30'. Etwa 20 Sterne 7. bis 11. Gr.
Draco	5866	15 3.8	+ 56 9	Kl. langgestreckter N. mit hellerem Zentrum.
Gemini	2168	6 2.7	+ 24 21	! Ziendl. verd. St.H., gr., Dm. 30'. Enthält rund 200 Sterne 10. bis 14. Gr.
	2304	6 49.0	+ 18 7	Gr. zerstr. St.H. Dm. 30'.
	2420	7 32.5	+ 21 48	Kl. zerstr. St.H. Dm. 3'. Etwa 10 Sterne 10. bis 12. Gr.
Hercules	6205	16 38.1	+ 36 39	!! ☉ ziendl. verd. Dm. 15'. Über 3000 Sterne 13. bis 15. Gr. In kleinen Fernrohren nicht aufl., sondern wie ein verwaschener * 4. Gr. erscheinend.
	6229	16 44.2	+ 47 42	☉ ? Äußerst gedrängt. Dm. 0'.4. Das Objekt macht den Eindruck eines nebligen Sternes 9. Gr.
	6341	17 14.1	+ 43 15	☉ ziendl. verd. Dm. 5'. Etwa 100 Sterne 13. bis 15. Gr. Erst im 7-Zöller aufl.; sonst wie ein verwascher * 5. Gr.
Leo major	2903	9 26.5	+ 21 56	! Spiral-N. mit hellem Kern.
Lyra	6720	18 49.9	+ 32 54	! Der bekannte Ringnebel. Ein elliptischer Ring mit einem schwachen * in der Mitte, der physisch mit dem N. verbunden ist. In kl. Fernrohren erscheint der N. als gleichmäßig helles, ovales Scheibchen. Gasspektrum.
	6779	19 12.7	+ 30 0	☉ ? Ein etwas unregelmäßiges, ziendl. verd. Gebilde. Dm. 2'.5. Etwa 25 Sterne 13. bis 15. Gr. In kl. Fernrohren erscheint das ganze als ein verwaschener Stern.
Monoceros	2244	6 27.0	+ 4 56	Zerstr. St.H. Dm. 15'. Etwa 15 Sterne 8. bis 11. Gr.
	2264	6 35.5	+ 9 59	Zerstr. St.H. Dm. 20'. Enthält circa 20 Sterne 8. bis 11. Gr.
	2301	6 46.6	+ 0 35	Grob zerstr., sehr unregelmäßiger St.H. Dm. 15'. Enthält etwa 25 Sterne 8. bis 11. Gr.
	2323	6 58.2	- 8 12	Zerstr. St.H. Dm. 15'. 40 Sterne 9. bis 12. Gr.
	2539	8 6.0	- 12 32	Zerstr. ziendl. gr. St.H. Dm. 25'. 50 Sterne 10. bis 14. Gr.
	2548	8 8.8	- 5 30	Ziendl. gr. zerstr. St.H. Dm. 25'. Darin etwa 40 Sterne 8. bis 12. Gr.
Ophiuchus	6171	16 26.9	- 12 50	☉ ? Ziendl. offen und etwas unregelmäßig. Dm. 3'.5. Etwa 50 Sterne 13. bis 14. Gr. In kl. Fernrohren macht das Gebilde den Eindruck eines verwaschenen Sternes 9. Gr.

Sternbild	N.G.C.	1900		Beschreibung
		A.R.	Decl.	
Ophiuchus	6218	^{h m} 16 42.0	^{° '} — 1 46	! ☉ zieml. verd. Dm. 10'. Zirka 400 Sterne 13. bis 15. Gr. In kl. Fernrohren nicht aufl.
	6254	16 51.9	— 3 57	! ☉ zieml. verd. Dm. 12'. 700 Sterne 13. bis 15. Gr. Gesamthelligkeit des Haufens wie ein * 7. Gr.
	6333	17 13.3	— 18 25	☉ verd. Dm. 5'. Enthält etwa 200 Sterne 13. bis 15. Gr. Mit kl. Objektöffnungen nicht aufl. und wie ein * 7. Gr. erscheinend.
	6356	17 17.8	— 17 43	☉ äußerst gedrängt. Dm. 2'. Das Gebilde macht den Eindruck eines verwaschenen Sternes 9. Gr.
	6402	17 32.4	— 3 11	! ☉ zieml. verd. Dm. 4'. 250 Sterne 14. bis 15. Gr. Wenn nicht aufl., erscheint das Objekt als nebliger * 6. Gr.
	—	17 41.4	+ 5 45	Zerstr. St. H., zieml. groß. Dm. 30'. Wenige Sterne 7. bis 10. Gr.
	6633	18 22.7	+ 6 30	Zerstr. St. H. Dm. 30'. Besteht aus etwa 25 Sternen 8. bis 10. Gr.
Orion	1976	5 30.4	— 5 27	!!! Unregelmäßiger diffuser N., mittlerer Teil des großen Orion-Nebels. Eines der großartigsten Nebelobjekte des Himmels. Unter den Sternen im N. sind zahlreiche Veränderliche. Von besonderem Interesse ist auch der vierfache Stern θ^1 , das sog. Trapez, im hellsten Teile des Nebels. Der N. hat ein ausgesprochenes Gasspektrum.
	1977	5 30.4	— 4 54	Nördl. Teil des großen Orion-Nebels. Dm 30'. Verschiedene helle Sterne in Nebelmaterie eingebettet.
	1980	5 30.5	— 5 59	Zerstr. Haufen von zwei hellen und mehreren schwachen Sternen, die in Nebelmaterie eingehüllt sind. Dm. 15'.
	1981	5 30.6	— 4 25	Haufen von acht helleren und vielen schwachen Sternen. Dm. 25'.
	2024	5 36.8	— 1 54	Zwei feine unregelmäßige Nebelgebilde nahe bei ξ Orions, jedes 10' bis 15' lang.
	2064	5 41.2	— 0 3	N., einem Doppelstern südlich folgend. Dm. 4'.
	7078	21 25.2	+ 11 44	!! ☉ verd. Dm. 10'. Im Haufen etwa 1000 Sterne 13. bis 15. Gr., darunter 51 Veränderliche. Wenn nicht aufl., erscheint das Objekt wie ein verwaschener * 6. Gr.
Pegasus	7331	22 32.5	+ 33 54	Zieml. länglicher N., heller im Zentrum.

Sternbild	N.G.C.	1900		Beschreibung
		A.R.	Decl.	
		h m	° '	
Perseus	869	2 12.0	+ 56 41	!! Ziemi. verd. St.-H., ausgezeichnetes Objekt für kleine Instrumente. Dm. 30'. Enthält mehr als 400 Sterne 7. bis 12. Gr. Das Objekt wird auch als h. Persei bezeichnet.
	884	2 15.4	+ 56 39	!! γ Persei. Erscheint mit dem vorgenannten Haufen gleichzeitig im Gesichtsfelde. Dm. 30'. 300 Sterne 7. bis 12. Gr. Zerstr. St.H. Dm. 30'. Etwa 40 Sterne 9. bis 13. Gr.
	1039	2 35.6	+ 42 21	Zerstr. St.H. Dm. 20'. Enthält zirka 40 Sterne 10. bis 14. Gr.
	1528	4 7.8	+ 50 59	
Puppis	2422	7 32.0	- 14 16	! Zerstr. St.H., bestehend aus 50 Sternen 6. bis 10. Gr. Dm. 40'.
	2437	7 37.2	- 14 35	! Zerstr. St.H., über 100 Sterne 11. bis 13. Gr. Dm. der Gruppe 40'.
Sagittarius	6494	17 51.0	- 19 0	Ziemi. verd. St.H. Dm. 30'. 100 Sterne 10. bis 14. Gr.
	6514	17 56.3	- 23 2	!! Unregelmäßiger Doppelnebel. Dm. 20'. Das größere Stück ist dreiteilig, daher <i>Triid</i> -Nebel. Einzelne Sterne sind eingestreut.
	6523	17 57.6	- 24 23	!! Unregelmäßiger N. ähnlich dem <i>Triid</i> -N., den er aber an Größe und Helligkeit übertrifft.
	6531	17 58.6	- 22 30	Ziemi. verd. St.H. nicht weit von dem N. 6523 entfernt. Dm. 15'. 25 Sterne 8. bis 13. Gr.
	6603	18 12.6	- 18 27	Ziemi. verd. St.H. in sehr sternreicher Gegend der Milchstraße. Dm. 5'. 25 Sterne 11. bis 14. Gr.
	—	18 25.8	- 19 19	Ziemi. verd. St.H., gr. Dm. 25'. Besteht aus 50 Sternen 9. bis 12. Gr.
	6645	18 26.8	- 16 58	Ziemi. verd. St.H. Dm. 15'. Zirka 100 Sterne 11. bis 15. Gr.
	6656	18 30.3	- 23 59	!! ☉ ziemi. verd. Dm. 12'. 1500 Sterne 13. bis 15. Gr., darunter 16 Veränderliche.
	6864	20 0.2	- 22 12	☉ äußerst gedrängt. Dm. 2'.5. Gesamthelligkeit wie ein * 8. Gr.
Scorpius	6093	16 11.1	- 22 44	! ☉ Dm. 5'. 500 Sterne 12. bis 15. Gr. In kl. Instrumenten nicht aufl., Gesamthelligkeit 6. Gr.
Scutum	6611	18 13.2	- 13 49	Zerstr. St.H. Dm. 15'. Etwa 25 Sterne 8. bis 12. Gr.
	6618	18 15.0	- 16 13	! Gr. unregelmäßiger N. Dm. 15'. Der sog. Omeganebel.
	6694	18 39.8	- 9 30	Zerstr. St.H. Dm. 6'. 25 Sterne 8. bis 12. Gr.

Sternbild	N.G.C.	1900		Beschreibung
		A.R.	Decl.	
		h m	° '	
Scutum	6750	18 45.7	— 6 23	! ☉ Offen und etwas unregelmäßig. Dm. 12'. Zirka 250 Sterne 12. bis 14. Gr.
	6712	18 47.6	— 8 50	☉ ? unregelmäßig, zieml. verd. Dm. 3'. Erscheint wie ein verwaschener Stern.
	6853	19 55.3	+ 22 27	! Der bekannte <i>Dumb-bell</i> -Nebel. Dm. 5'. Gasspektrum mit hellen Linien.
Serpens	5904	15 13.5	+ 2 27	!! ☉ verd. Dm. 12'. Über 1000 Sterne 13. bis 15. Gr., darunter 85 veränderliche. Erst im 8-Zöller aufl. In kleineren Fernrohren erscheint das Objekt als blasses Wölkchen, einem Stern 5. Gr. an Helligkeit vergleichbar.
Taurus	—	3 41.0	+ 23 48	! Die Plejaden. Ausgedehnter Haufen von einigen Hundert Sternen 3. bis 14. Gr. 7 bis 10 davon mit freiem Auge sichtbar.
	1647	4 40.2	+ 18 53	Zerstr. St.H. zieml. gr. Dm. 30'. Etwa 50 Sterne 8. bis 14. Gr.
	1746	4 58.0	+ 23 40	Unregelmäßiger zerstr. St.H. 50 Sterne 9. bis 14. Gr. stehen auf einem Raum von 30' Dm.
	1952	5 28.5	+ 21 57	Gleichmäßig heller, elliptischer N. 3' lang, 1' breit. Unter den Namen <i>Crab</i> -Nebel bekannt.
Triangulum	589	1 28.2	+ 30 9	Schwacher ovaler N., darin 2 oder 3 Sterne. Spiralnebel?
Ursa major.	4051	11 58.0	+ 45 5	Länglicher N. Spiralnebel?
Virgo	4303	12 16.8	+ 5 2	Spiralnebel mit hellem Kern. Dm. 2'.
	4374	12 20.0	+ 13 26	Länglicher N., im Zentrum etwas heller. Dm. 0'.5.
	4406	12 21.1	+ 13 30	Schwacher, länglicher N., etwas heller im Zentrum. Dm. 0'.5. Spiralnebel?
	4472	12 24.7	+ 8 33	N. im Zentrum viel heller als an den Rändern. ☉ oder Spiralnebel?
	4486	12 25.8	+ 12 57	Runder, zieml. schwacher N., im Zentrum heller. ☉ oder Spiralnebel?
	4526	12 29.0	+ 8 15	Schwacher N. mit hellerem Kern. 2' lang, 1' breit. Spiralnebel?
	4569	12 31.8	+ 13 43	Schwacher länglicher N. mit hellem Kern. 3' lang, 1' breit. Spiralnebel?
	4594	12 34.8	— 11 4	Langgestreckter N. mit Kern und Andeutungen spiraliger Struktur.



IV.

Veränderliche Sterne.

Die Beschäftigung mit den veränderlichen Sternen ist für den beobachtenden Liebhaber zweifellos das angemessenste und dankbarste Arbeitsfeld, seitdem wir in der *Argelanderschen* Stufenschätzungsmethode ein Beobachtungsverfahren besitzen, das rasch zu erlernen und leicht zu handhaben ist, sich überdies stets den vorhandenen Mitteln und der verfügbaren Zeit anpassen läßt. Wer darauf angewiesen ist, ohne Instrument oder nur mit dem Opernglase zu beobachten, beschränkt sich eben auf die zehn bis zwanzig hellen Veränderlichen und hat daran, wenn er die Sache ernst nimmt, vollauf zu tun. Schon der Besitz eines 2- oder 3-Zöllers erweitert aber den Bereich der Möglichkeiten so sehr, daß der Beobachter nur die Qual der Wahl hat und sich aus den Hunderten von Beobachtungsobjekten mit Leichtigkeit ein seinen Verhältnissen entsprechendes Arbeitsprogramm zusammenzustellen vermag.

Im folgenden bringen wir nun eine kleine Auswahlliste von etwa 80 Veränderlichen aller Typen. Es sind im allgemeinen nur solche Sterne berücksichtigt, die im Maximum mit einem 6mal vergrößernden Feldstecher, im Minimum mit dem 3-Zöller noch gut beobachtet werden können, oder anders ausgedrückt, die im Maximum mindestens die 7. Größe erreichen, und im Minimum nicht unter die 11. Größe herabsinken.

Die Daten für die Veränderlichen beruhen auf dem von *Müller* und *Hartwig* herausgegebenen Katalog der *Astronomischen Gesellschaft*. Für jeden Stern ist in einem kleinen Abschnitt alles Wissenswerte zusammengestellt. An der Spitze steht die laufende Nummer jenes Kataloges und die Bezeichnung des Sterns. Die Positionen beziehen sich auf 1900; um das Einstellen am Fernrohr zu erleichtern, sind jedesmal die jährlichen Präzessionsbeträge beigedruckt. Die Farbe ist in der Ziffern-

skala, das Spektrum im *Harvard*-System angegeben. Dann folgen Angaben über die Helligkeit im Maximum und Minimum und über die Elemente des Lichtwechsels, nämlich die Zeit des als Ausgangspunkt für die Periodenzählung dienenden Hauptmaximums oder -minimums (die sog. Epoche), kalendarisch und julianisch ausgedrückt und die mittlere Periode in Tagen nebst etwaigen Zusatzgliedern¹⁾. Den Schluß bildet eine Mitteilung über den Entdecker und das Jahr der Entdeckung, sowie eine kurze Charakterisierung der Art des Lichtwechsels auf Grund folgender Einteilung der Veränderlichen.

- A. Unperiodische Veränderliche. Die Lichtschwankungen sind nicht an eine feste, stets wiederkehrende Periode gebunden, sondern verlaufen regellos.
- B. Langperiodische Veränderliche. Die Periode ist im allgemeinen konstant, während die Amplitude und die Gestalt der Lichtkurve Änderungen unterliegen.
- C. Kurzperiodische Veränderliche mit kontinuierlichen und durchaus regelmäßigen Lichtschwankungen.
- D. Bedeckungsveränderliche. Die konstante Maximalhelligkeit wird in regelmäßigen Intervallen von Minimis unterbrochen.

Besser als Worte kennzeichnet die bildliche Darstellung mittels der Lichtkurve den Verlauf der Helligkeitsänderungen. Um das Interesse des Beobachters zu wecken, habe ich deshalb auch die Lichtkurven der hier behandelten Sterne, soweit mir die Quellen zugänglich waren, zusammengestellt. Man findet sie auf drei Tafeln am Schluß des Büchleins vereinigt.

Für zahlreiche Veränderliche sind dann noch Vergleichsternlisten beigelegt, und zwar wurde hierzu vor allem das reiche Material herangezogen, das die Bände 37, 57 und 63 der *Harvard Annalen* enthalten. Die Listen geben in der ersten Kolumne eine kurze Bezeichnung der Sterne, in der zweiten und dritten die Position für 1900 und in der letzten die photometrische Größe. Bei den Vergleichsternen für die helleren Veränderlichen sind außerdem noch Farbe und Spektrum mit-

¹⁾ Belehrung über diese Dinge, sowie alles, was die Beobachtung der veränderlichen Sterne betrifft, findet man in dem bereits erwähnten *Hevelius*-Handbuch.

geteilt, dafür aber die Positionen fortgelassen. Helligkeitsangaben, die nicht der *Harvard-Photometry*, sondern der *Potsdamer Durchmusterung* entstammen, sind durch Kursivdruck kenntlich gemacht.

Die beigedruckten Umgebungskärtchen stellen größtenteils Ausschnitte aus dem Atlas der *Bonner Durchmusterung* dar; bei jeder Karte ist die ungefähre Helligkeit der eingezeichneten Sterne angegeben, sowie das Jahr, für das die Positionen gelten. Die Buchstabenbezeichnungen stimmen mit denen der Vergleichsternlisten überein.¹⁾



1. Aquila. (Der Adler.)

1269. **R** ($19^h 1^m 33^s + 2^s.89; + 8^0 4'.7 + 0'.09$).

Farbe 7, Spektrum Md. 10. Maximum $6^m - 7^m$, Minimum 10^m bis 11^m . Elemente: Max. = 1870 Okt. 9 = $2404345^d + 340^d.27 E - 0^d.2928 E^2 + 0^d.00118 E^3$. — (Bonn) 1855. (B.) Die Periode hat seit Entdeckung des Lichtwechsels beständig abgenommen. (Lichtkurve Abb. 58, Tafel I.)

Vergleichsterne.

a	18 ^h	57 ^m	33 ^s	+ 8 ⁰	14'.0	6 ^m .12	k	19 ^h	3 ^m	0 ^s	+ 7 ⁰	51'.0	9 ^m .12
b	19	3	28	+ 8	49.6	7.18	m	19	1	25	+ 7	53.1	9.49
c	18	59	41	+ 8	9.4	7.77	n	19	0	28	+ 7	44.6	10.12
d	19	0	4	+ 8	19.8	7.94	o	19	2	51	+ 7	40.1	10.45
e	19	2	22	+ 8	11.6	8.30	p	19	3	0	+ 8	25.5	10.71
f	19	0	8	+ 8	4.2	8.50	q	19	2	20	+ 7	44.1	10.94
g	19	2	26	+ 7	58.6	8.85	r	19	1	21	+ 8	4.6	11.14



¹⁾ Infolge eines Versehens sind die Kärtchen typographisch nicht alle ganz gelungen. — Bei etwaigen Unstimmigkeiten zwischen Karte und Sternverzeichnis halte man sich stets an das letztere.

1320. U ($19^h 23^m 58^s + 3^s.23$; $- 7^0 15'.0 + 0'.12$).

Farbe 1, Spektrum G. Maximum $6^m.2$, Minimum $6^m.9$. Elemente:
Max: 1886 Sept. 20 = $2410 170^d.325 + 7^d.02387$ E. — Sawyer 1886. (C.)
(Lichtkurve Abb. 59, Tafel I.)

Vergleichsterne.

a	$19^h 54^m 21^s$	$- 10^0 13'.2$	$5^m.88$
b	$19 43 31$	$- 11 7.2$	6.32
c	$19 30 6$	$- 7 40.6$	6.45
d	$19 14 41$	$- 6 48.0$	6.92
e	$19 25 32$	$- 6 43.1$	7.29

1256. V ($18^h 59^m 4^s + 3^s.20$; $- 5^0 50'.0 + 0'.09$).

Farbe 9.0, Spektrum Np. Maximum $6^m.7$, Minimum $8^m.0$. Unregelmäßig. — Knott 1871. (A.) Mehrfache Versuche, die Lichtänderungen in eine Periode zu bringen, sind gescheitert.

1360. η ($19^h 47^m 23^s + 3^s.06$; $+ 0^0 44'.9 + 0'.15$).

Farbe 5.1, Spektrum G 0. Maximum $3^m.8$, Minimum $4^m.5$. Elemente:
Max. = 1848 Mai 20 = $2396 168^d.731 + 7^d.176382$ E. Periode veränderlich? — Pigott 1784. (C.) Ein typischer Blinkstern. Bemerkenswert wegen der zu vermutenden Änderung der Periodenlänge und verschiedener Unregelmäßigkeiten, die zeitweilig im absteigenden Aste der Lichtkurve auftreten. Verdient andauernde Überwachung. (Lichtkurve Abb. 60a und b, Tafel I.)


Vergleichsterne.

δ Aquilae	$3^m.74$	$4^c.0$	F	ι Aquilae	$2^c.9$	B5
β "	3.82	4.9	K	μ "	$4^m.56$	6.5 K
ε "	4.28	5.7	K	ν "	4.82	4.7 A8

2. Aries. (Der Widder.)

133. RR ($1^h 50^m 16^s + 3^s.34$; $+ 23^0 5'.2 + 0'.30$).

Maximum 6^m , Minimum 7^m . Periode 70^d ? — Argelander, Hornig 1914.
Die Art der Lichtänderung ist nur ungenau bekannt.




3. Auriga. (Der Fuhrmann.)

391. **RT** ($6^h 22^m 8^s + 3^s.86; + 30^\circ 33'.3 - 0'.03$).

Farbe 4,5, Spektrum F. Maximum $4^m.9$, Minimum $5^m.9$. Elemente:
Max. = 1905 Nov. 23 = $2417173^d.36 + 3^d.7282 \cdot E - Astbury 1905$. (C.)
(Lichtkurve Abb. 61, Tafel I.)



Vergleichsterne.

a	6^h	9^m	0^s	$+ 29^\circ$	$32'.1$	$4^m.45$
b	6	28	54	$+ 28$	6.0	5 .05
c	6	32	3	$+ 29$	4.2	5 .55
d	6	33	15	$+ 28$	21.1	5 .84
e	6	27	7	$+ 33$	6.5	6 .30
f	6	14	50	$+ 29$	34.3	6 .32



401. **UU** ($6^h 29^m 40^s + 4^s.13; + 38^\circ 31'.6 - 0'.04$).

Farbe 8,3, Spektrum N. Maximum $5^m.4$, Minimum $6^m.0$. Der Lichtwechsel ist wahrscheinlich unperiodisch. — *Backhouse 1894*.



51. **WW** ($6^h 25^m 56^s + 3^s.92; + 32^0 31'.6 - 0'.04$).

Maximum $6^m.0$, Minimum $6^m.5$. Elemente: Min. = 2421632^d, 200 = 1918 Febr. 7 $4^h 48^m + 1^d 6^h 18^m 1^s.64$. (E — 19). — *Schwab* 1918. (D.)

227. ϵ ($4^h 54^m 47^s + 4^s.30; + 43^0 40'.5 + 0'.09$).

Farbe 4.5, Spektrum F5. Maximum $3^m.3$, Minimum $4^m.1$. Elemente: Min. = 1902 April 10 = 2415850^d + 9900^d. — *Fritsch* 1821. (D.) Merkwürdig wegen der ungewöhnlich langen Periode.

Vergleichsterne.

θ	Aurigae	2 ^m .87	1 ^c .8	Aop
η	"	3 .46	1 .7	B3
ζ	"	3 .85	6 .7	Comp.
δ	"	3 .92	5 .4	Ko
ν	"	4 .18	5 .0	Ko

4. Cancer. (Der Krebs.)

509. **X** ($8^h 49^m 45^s + 3^s.39; + 17^0 36'.6 - 0'.22$).

Farbe 8.5, Spektrum N. Maximum $6^m.0$, Minimum $7^m.3$. Der Lichtwechsel ist unperiodisch. — *Birmingham* 1871.



518. **RS** ($9^h 4^m 36^s + 3^s.64; + 31^0 22'.3 - 0'.24$).

Farbe 7.5, Spektrum Mc. Maximum $5^m.4$, Minimum $6^m.6$. Der Lichtwechsel ist unperiodisch. — *Pickering* 1903. (Karte siehe S. 57.)

5. Canes venatici. (Die Jagdhunde.)

749. **V** ($13^h 15^m 6^s + 2^s.63; + 46^0 3'.1 - 0'.32$).

Farbe 6. Maximum $6^m.8$, Minimum $7^m.9$. Elemente: Max. = 1914 Juli 19 = 2420333^d + 192^d. E. — *Cannon* 1910. (B?) Vielleicht unperiodisch.



714. **Y** ($12^h 40^m 26^s + 2^s.83; + 45^0 59'.2 - 0'.33$).

Farbe 8, Spektrum N. Maximum $5^m \pm$, Minimum $6^m \pm$. Lichtwechsel unperiodisch. — *Schmidt* 1873. Verschiedentlich abgeleitete Periodenwerte haben sich nicht bestätigt.


6. Canis major. (Der große Hund.)

441. **R** ($7^h 14^m 56^s + 2^s.70$; $-16^\circ 12'.4 - 0'.11$).

Farbe 0. Spektrum F. Maximum $5^m.8$, Minimum $6^m.4$. Elemente:
Min. = 1887 März 26 = $2410357^d.634 + 1^d.135953 \cdot E$. — *Sawyer* 1887. (D.)
In der Mitte zwischen je zwei Hauptminimis vielleicht ein schwaches
Nebenminimum.

Vergleichsterne.


a	$7^h 20^m 9^s$	$-16^\circ 0'.3$	$5^m.20$
b	$7 \ 11 \ 43$	$-15 \ 24.5$	$5 \ .39$
c	$7 \ 16 \ 23$	$-14 \ 10.4$	$5 \ .73$
d	$7 \ 22 \ 41$	$-17 \ 39.8$	$5 \ .76$
e	$7 \ 20 \ 33$	$-13 \ 33.3$	$5 \ .89$
f	$7 \ 20 \ 30$	$-18 \ 48.2$	$6 \ .20$
g	$7 \ 14 \ 52$	$-17 \ 19.7$	$6 \ .61$



7. Cassiopeia.

54. **RU** ($1^h 5^m 10^s + 3^s.86$; $+64^\circ 29'.2 + 0'.32$).

Farbe 3.5, Spektrum A. Maximum $5^m.6$, Minimum $6^m.0$? Veränderlichkeit noch nicht sichergestellt. — *Miller Barr* 1904. (D?)





121. **RZ** ($2^h 39^m 54^s + 5^s.34$; $+69^\circ 12'.8 + 0'.26$).

Farbe 3, Spektrum A. Maximum $6^m.5$, Minimum $8^m.1$. Elemente:
Min. = 1906 Mai 24 = $2417355^d.4233 + 1^d.195254 \cdot E$. — *Müller* 1906. (D.)
Eine vermutete Abnahme der Periodenlänge bedarf noch der Bestätigung.
(Lichtkurve Abb. 62, Tafel I.)

Vergleichsterne.

a	2 ^h 36 ^m 13 ^s	+ 67° 24'.0	6 ^m .05
b	2 43 3	+ 68 28.4	6 .08
c	2 27 13	+ 67 55.5	6 .76
d	2 27 53	+ 67 2.3	7 .28
e	2 28 53	+ 68 37.9	7 .42
f	2 32 42	+ 69 15.8	7 .74
g	2 30 3	+ 68 52.3	8 .04



125. SU (2^h 43^m 3^s + 5^s.28; + 68° 28'.5 + 0'.25).

Farbe 4, Spektrum F3. Maximum 5^m.9, Minimum 6^m.3. Elemente:
Max. = 1906 März 17 = 2417287^d.30 + 1^d.9498 · E. — Müller u. Kempf
1906. (C.) (Lichtkurve Abb. 63, Tafel I.)

36. α (0^h 34^m 50^s + 3^s.37 + 55° 59'.3 + 0'.33).

Farbe 6, Spektrum K. Maximum 2^m.2, Minimum 2^m.8. Der Lichtwechsel verläuft unperiodisch. — Birt 1831.

1670. ρ (23^h 49^m 23^s + 2^s.98; + 56° 56'.6 + 0'.33).

Farbe 7, Spektrum F8. — Wells 1901. (A?) Max. 4^m.4, Min. 4^m.9.
Der Charakter des Lichtwechsels steht noch nicht fest. Merkwürdig ist
das Zusammentreffen rötlicher Farbe mit frühem Spektraltypus.


Vergleichsterne.

ζ Cassiopeiae	4 ^m .08	2°.3	B3
κ	4 .38	3.8	B0
ο	4 .86	3.3	B2
λ	4 .93	2.0	B8
τ	5 .00	6.3	K
σ	5 .12	2.9	B2

8. Cepheus.

1507. T ($21^h 8^m 13^s + 0^s.81$; $+ 68^0 5'.0 + 0'.24$).

Farbe 7.5, Spektrum Md 9. Maximum 5.5 — 7.0, Minimum 9.5 bis 10.6. Elemente: Max. = 1882 Jan. 4 = $2408450^d.5 + 386^d.7 \cdot E$. — Ceraski 1878. (B.) (Lichtkurve Abb. 64, Tafel I.)



48. U ($0^h 53^m 24^s + 5^s.10$; $+ 81^0 20'.2 + 0'.33$).

Farbe 0, Spektrum A. Maximum $6^m.8$, Minimum $9^m.2$. Elemente: Min. = 1880 Juni 23 = $2407890^d.324 + 2^d.4928762 \cdot E$. — Ceraski 1880. (D.) (Lichtkurve Abb. 65, Tafel I.)

Vergleichsterne.

a	$0^h 32^m 15^s$	$+ 81^0 56'.5$	$6^m.38$	g	$0^h 55^m 27^s$	$+ 81^0 42'.7$	$8^m.52$
b	1 10 10	$+ 80 22.3$	6 .74	h	1 3 25	$+ 81 14.9$	8 .58
c	1 9 38	$+ 80 20.2$	7 .20	k	0 42 30	$+ 81 3.6$	8 .96
d	1 8 29	$+ 81 1.9$	7 .73	l	0 43 56	$+ 81 8.1$	9 .17
e	0 56 20	$+ 81 25.5$	8 .09	m	0 44 43	$+ 81 12.6$	9 .54
f	0 54 46	$+ 81 33.9$	8 .44				

1603. δ ($22^h 25^m 27^s + 2^s.22$; $+ 57^0 54'.2 + 0'.31$).

Farbe 4.7, Spektrum G0. Maximum $3^m.6$, Minimum $4^m.2$. Elemente: Max. = 1841 Juli $7^d.856 = 2393659^m.856 + 5^d.366387 \cdot E$. — Goodricke 1784. (C.) Hauptvertreter des Blinksternotypus. (Lichtkurve Abb. 66, Tafel I.)

Vergleichsterne.

β Cephei	$3^m.48$	$2^s.3$
ζ "	$3 .60$	$6 .1$
ι "	$3 .68$	$5 .2$
7 Lacertae	$3 .94$	$3 .2$
ε Cephei	$4 .36$	$3 .6$
ξ "	$4 .42$	$4 .0$
ν "	$4 .48$	$4 .3$

1545. μ ($21^{\text{h}} 40^{\text{m}} 27^{\text{s}} + 1^{\text{s}}.83; + 58^{\circ} 19'.3 + 0'.27$).

Farbe 7.9, Spektrum Ma. Maximum $4^{\text{m}}.0$, Minimum $4^{\text{m}}.8$. Unperiodischer Lichtwechsel. — *Hind* 1848. (A.) (Lichtkurve Abb. 67, Tafel I.)

9. Cetus. (Der Walfisch.)

98. σ ($2^{\text{h}} 14^{\text{m}} 18^{\text{s}} + 3^{\text{s}}.03; - 3^{\circ} 25'.9 + 0'.28$).

Farbe 7.6, Spektrum Md. 9. Maximum 1.7—5.2, Minimum 8.7—10.0. Elemente: Max. = 1901 Juli 8 = $2415574^{\text{d}}.96 + 331^{\text{d}}.6926 \cdot \text{E}$; dazu 4 periodische Glieder. — *Fabrizius* 1596. (B.) Die Gestalt der Lichtkurve wechselt. (Vgl. Abb. 68 a, b, Tafel II.) Der Stern ist auch als Mira Ceti bekannt.

Vergleichsterne.

a	$4^{\text{h}} 30^{\text{m}}.2$	$+ 16^{\circ} 19'$	$1^{\text{m}}.26$	q	$2^{\text{h}} 54^{\text{m}}.3$	$+ 8^{\circ} 31'$	$4^{\text{m}}.93$
b	$7 \ 28 \ .2$	$+ 32 \ 6$	$1 \ .66$	r	$2 \ 30 \ .6$	$+ 5 \ 9$	$5 \ .10$
c	$5 \ 20 \ .0$	$+ 28 \ 31$	$1 \ .86$	s	$2 \ 27 \ .1$	$- 1 \ 28$	$5 \ .38$
d	$5 \ 52 \ .2$	$+ 44 \ 56$	$2 \ .03$	t	$2 \ 17 \ .1$	$- 1 \ 20$	$5 \ .53$
e	$2 \ 1 \ .5$	$+ 22 \ 59$	$2 \ .19$	u	$2 \ 16 \ .8$	$- 0 \ 4$	$5 \ .67$
f	$0 \ 38 \ .6$	$- 18 \ 32$	$2 \ .39$	w	$2 \ 12 \ .8$	$+ 1 \ 17$	$5 \ .84$
g	$2 \ 57 \ .1$	$+ 3 \ 42$	$2 \ .68$	x	$2 \ 25 \ .7$	$- 0 \ 11$	$6 \ .08$
h	$1 \ 59 \ .1$	$+ 20 \ 19$	$2 \ .95$	y	$2 \ 20 \ .0$	$- 3 \ 14$	$6 \ .36$
k	$2 \ 38 \ .1$	$+ 2 \ 49$	$3 \ .56$	z	$2 \ 14 \ .6$	$- 4 \ 48$	$6 \ .67$
l	$1 \ 56 \ .9$	$+ 2 \ 17$	$3 \ .83$	α	$2 \ 19 \ .4$	$- 3 \ 33$	$7 \ .28$
m	$2 \ 34 \ .4$	$- 0 \ 6$	$4 \ .13$	β	$2 \ 15 \ .1$	$- 3 \ 59$	$8 \ .02$
n	$2 \ 22 \ .8$	$+ 8 \ 1$	$4 \ .27$	γ	$2 \ 18 \ .7$	$- 3 \ 50$	$8 \ .58$
o	$2 \ 7 \ .7$	$+ 8 \ 23$	$4 \ .39$	δ	$2 \ 16 \ .6$	$- 3 \ 25$	$8 \ .82$
p	$2 \ 39 \ .5$	$+ 9 \ 42$	$4 \ .62$	ϵ	$2 \ 14 \ .5$	$- 3 \ 25$	$9 \ .19$

16. T ($0^{\text{h}} 16^{\text{m}} 42^{\text{s}} + 3^{\text{s}}.04; - 20^{\circ} 36'.8 + 0'.33$).

Farbe 8, Spektrum Mb. Maximum $5^{\text{m}}.4$, Minimum $6^{\text{m}}.9$. Elemente: Max. = 1882 Jan. 3 = $2408449^{\text{d}} + 162^{\text{d}}.2 \cdot \text{E}$. Unregelmäßigkeiten. — *Chandler* 1881. (B.) Der Lichtwechsel mit seinen Unregelmäßigkeiten in der Periodenlänge und der Gestalt der Lichtkurve ähnelt dem von R. Scuti.


10. Corona. (Die Krone.)

880. R ($15^{\text{h}} 44^{\text{m}} 27^{\text{s}} + 2^{\text{s}}.47; + 28^{\circ} 27'.8 - 0'.19$).

Farbe 1.5, Spektrum Pec. Maximum $5^{\text{m}}.8$, Minimum $11^{\text{m}}-15^{\text{m}}$. Unperiodischer Lichtwechsel. — *Pigott* 1795. Tiefe, unregelmäßig gestaltete Minima unterbrechen in kürzeren oder längeren Zeiträumen die völlig konstante Maximalhelligkeit des Sternes. (Lichtkurve Abb. 69, Tafel II.)

Vergleichsterne.


a	15 ^h 17 ^m 8	+ 33° 17'	5 ^m 28	l	15 ^h 43 ^m 0	+ 29° 24'	8 ^m 60
b	15 40 .1	+ 32 50	5 .56	m	15 41 .6	+ 29 16	8 .88
c	16 12 .7	+ 29 23	5 .94	n	15 48 .0	+ 27 54	9 .20
d	16 11 .7	+ 27 41	6 .15	o	15 48 .2	+ 28 24	9 .49
e	15 44 .1	+ 32 2	6 .72	p	15 43 .2	+ 28 35	9 .82
f	15 43 .6	+ 28 46	7 .18	q	15 43 .2	+ 28 37	10 .29
g	15 48 .4	+ 29 13	7 .63	r	15 44 .3	+ 28 43	10 .66
h	15 41 .1	+ 28 47	7 .93	s	15 43 .3	+ 28 34	11 .10
k	15 49 .1	+ 28 6	8 .28				



11. Cygnus. (Der Schwan.)

1534. W (21^h 32^m 14^s + 2^s.27; + 44° 55'.6 + 0'.27).

Farbe 6.5, Spektrum Mc. Maximum 5^m.5, Minimum 6^m.6. Elemente: Max. = 1908 März 19 = 2418020^d + 129^d.6 · E. Unregelmäßigkeiten in der Periode. — Gore 1885. (B?) Der Stern gehört zur Klasse der halbregelmäßigen Veränderlichen. Zu gewissen Zeiten verläuft der Lichtwechsel ganz gesetzmäßig mit deutlich ausgesprochenen Maximis und Minimis, zu andern Zeiten dagegen äußert er sich nur in kleinen, regellosen Schwankungen. (Lichtkurve Abb. 70, Tafel II.)




1451. X ($20^h 39^m 29^s + 2^s.35; + 35^{\circ} 13'.6 + 0'.21$).

Farbe 0? Spektrum F5p. Maximum $6^m.3$, Minimum $7^m.2$. Elemente:
Max. = 1886 Okt. 10 + $2410190^d.68 + 16^d.38543 \cdot E$. Lichtkurve ver-
änderlich. — *Chandler* 1886. (C.) (Lichtkurve Abb. 71, Tafel II.)


Vergleichsterne.

a	$20^h 25^m 32^s$	$+ 36^{\circ} 7'.2$	$5^m.94$	d	$20^h 45^m 16^s$	$+ 35^{\circ} 11'.1$	$6^m.72$
b	$20 \ 27 \ 11$	$+ 36 \ 35.9$	$6 \ .30$	e	$20 \ 36 \ 2$	$+ 35 \ 1.9$	$6 \ .88$
c	$20 \ 38 \ 29$	$+ 35 \ 5.8$	$6 \ .50$	f	$20 \ 37 \ 46$	$+ 35 \ 11.2$	$7 \ .41$



1467. Y ($20^h 48^m 4^s + 2^s.40; + 34^{\circ} 16'.9 + 0'.22$).

Farbe 0, Spektrum A. Maximum $7^m.0$, Minimum $7^m.7$. Elemente:
Min. = 1886 Dez. 9 = $2410250^d.406 + 2^d.996336 \cdot E$. Periodische Ungleich-
heiten. — *Chandler* 1886. (D.) Die Minima sind von ungleicher Tiefe.
(Lichtkurve Fig. 72, Tafel II.)



Vergleichsterne.

a	$20^h 46^m 58^s$	$+ 34^{\circ} 22'.5$	$6^m.73$
b	$20 \ 54 \ 39$	$+ 34 \ 20.3$	$7 \ .71$
c	$20 \ 51 \ 39$	$+ 33 \ 38.3$	$7 \ .99$
d	$20 \ 49 \ 4$	$+ 34 \ 22.2$	$8 \ .17$
e	$20 \ 47 \ 1$	$+ 34 \ 7.0$	$8 \ .63$
f	$20 \ 48 \ 40$	$+ 34 \ 24.4$	$9 \ .10$


1407. RS ($20^h 9^m 46^s + 2^s.18; + 38^{\circ} 25'.6 + 0'.18$).

Farbe 10? Spektrum N. Maximum $7^m.0$. Minimum $8^m.5$. Licht-
wechsel unperiodisch? — *Espin* 1887. (A?)

RS Cygni

Vergleichsterne.

a	20 ^h 12.4 ^m	+ 38° 35'	6 ^m .23
b	20 10.3	+ 38 51	6 .90
c	20 9.7	+ 38 28	7 .25
d	20 8.0	+ 38 35	7 .51
e	20 7.8	+ 38 31	7 .75
f	20 8.1	+ 38 23	8 .15
g	20 9.8	+ 38 11	8 .17
h	20 8.2	+ 38 24	8 .28
k	20 9.4	+ 38 10	8 .58
l	20 9.4	+ 38 40	8 .80
m	20 9.9	+ 38 25	9 .05




1344. SU (19^h 40^m 48^s + 2^s.40; + 29° 1'4 + 0'.14).

Farbe 4.5, Spektrum F5. Maximum 6^m.7, Minimum 7^m.3. Elemente:

Max. = 1897 Okt. 4 = 2414202^d, 820 + 3^d.845 612 · E. — Müller u. Kempf 1897.
C.) (Lichtkurve Fig. 73, Tafel II.)

Vergleichsterne.

a	19 ^h 45 ^m 51 ^s	+ 28° 10'9	6 ^m .20
b	19 38 49	+ 29 5.6	6 .42
c	19 44 42	+ 29 9.0	7 .13
d	19 41 46	+ 30 0.6	7 .53
e	19 38 14	+ 29 15.5	7 .67
f	19 41 5	+ 29 20.8	8 .08




1326. AF (19^h 27^m 13^s + 1^s.79; + 45° 56'3 + 0'.12).

Farbe 4? Spektrum Mc 5. Maximum 6^m.9, Minimum 8^m.0. Elemente:

Max. = 1911 Okt. 25 = 2419335^d + 94^d.5 · E. Ausgangsmaximum und
Periodenwert noch ziemlich unsicher. — Fleming 1910. (B.)

AF Cygni.




1358. z ($19^h 46^m 43^s + 2^s.31; + 32^0 39'.7 + 0'.15$).

Farbe 7.5, Spektrum Md 6. Maximum 3.3—7.3, Minimum 12—14. Elemente: Max. = 1687 Nov. 27 = $2337555^d + 404^d.908 \cdot E$. Dazu ein quadratisches und ein Sinusglied. Starke Unregelmäßigkeiten. — Kirch 1686. (B.) (Lichtkurve Fig. 74 a und b, Tafel II.)

Vergleichsterne.

a	$18^h 55.2^m$	$+ 32^0 33'$	$3^m.30$
b	17 53.9	$+ 29 16$	3 .85
c	19 52.6	$+ 34 49$	4 .04
d	19 12.9	$+ 37 57$	4 .41
e	19 10.4	$+ 38 58$	4 .66
f	19 42.6	$+ 33 30$	5 .06
g	19 38.9	$+ 32 11$	5 .55
h	19 40.1	$+ 33 55$	5 .73
k	19 42.7	$+ 32 38$	6 .09
l	19 45.0	$+ 33 12$	6 .40
m	19 45.0	$+ 35 4$	6 .60
n	19 50.0	$+ 34 19$	6 .93
o	19 42.4	$+ 31 52$	7 .32
p	19 45.2	$+ 32 33$	7 .53
q	19 48.1	$+ 31 21$	7 .76
r	19 46.2	$+ 32 24$	8 .11
s	19 45.9	$+ 33 2$	8 .39
t	19 47.6	$+ 32 50$	8 .68
u	19 48.2	$+ 32 42$	9 .01
w	19 46.3	$+ 32 53$	9 .28
x	19 46.9	$+ 32 59$	9 .56

y	$19^h 45.8^m$	$+ 32^0 38$	$9^m.88'$
z	19 45.7	$+ 32 53$	10 .22
α	19 46.3	$+ 32 43$	10 .53
β	19 47.1	$+ 32 38$	10 .79
γ	19 46.5	$+ 32 36$	11 .00



12. Draco. (Der Drache.)

726. RY ($12^h 52^m 30^s + 2^s.37; + 66^0 32'.2 - 0'.33$).

Farbe 7.8, Spektrum Np. Maximum $6^m.1$, Minimum $7^m.0$. Unperiodischer Lichtwechsel. — Müller u. Kempf 1906. (A.)

1322. UX ($19^h 25^m 7^s - 2^s.06; + 76^0 21'.7 + 0'.12$).

Farbe 8.3, Spektrum N. Maximum $6^m.5$, Minimum $8^m?$ Lichtwechsel unperiodisch. — Birmingham 1872. (A.)

13. Gemini. (Die Zwillinge.)



399. W ($6^h 29^m 14^s + 3^s.44; + 15^0 24'.5 - 0'.04$).

Farbe 5, Spektrum Pec. Maximum $6^m.6$, Minimum $7^m.6$. Elemente: Max. = 1895 März 13 = $2413 266.34 + 7^d.91 603 \cdot E$. Nebenmaxima und -minima. — Sawyer 1896. (C.) (Lichtkurve Fig. 75, Tafel II.)

Vergleichsterne.

a	6 ^h 27 ^m 55 ^s	+14° 13'.9	5 ^m .61
b	6 25 52	+15 58.2	6 .40
c	6 29 8	+16 16.6	6 .52
d	6 26 36	+15 47.0	7 .10

e	6 ^h 30 ^m 44 ^s	+15 50'.4	7 ^m .14
f	6 28 40	+14 49.7	7 .46
g	6 25 49	+15 29.2	7 .72
h	6 29 4	+15 9.3	8 .22
k	6 31 59	+15 15.5	8 .25



372. TV ($6^h 5^m 51^s + 3^s.61; + 21^\circ 53'.4 - 0'.01$).

Farbe 7.5. Maximum 6^m.7, Minimum 8^m.0. Der Lichtwechsel ist unperiodisch. — *Backhouse* 1892. (A.)

423. ζ ($6^h 58^m 11^s + 3^h.56; + 20^\circ 43'.0 - 0'.08$).

Farbe 4.5, Spektrum Go. Maximum 3^m.7, Minimum 4^m.3. Elemente: Max. = $2410639^d.339 + 10^d.15375 \cdot E + 0^d.62 \sin [0.112 \cdot E + 116^\circ.5]$. — *Schmidt* 1847. (C.) (Lichtkurve Fig. 76, Tafel III.)

Vergleichsterne.

δ Geminorum	3.69 ^m	3 ^c .7	F
ε	3.75	4.7	G5
λ	3.75	3.0	A2

ι Geminorum	3.96 ^m	5 ^c .4	K
υ	4.18	6.6	K5
ν	4.42	2.9	B5

378. η ($6^h 8^m 50^s + 3^s.63; + 22^\circ 32'.2 - 0'.01$).

Farbe 7, Spektrum Ma. Maximum 3^m.4, Minimum 3.7—4.1. Epoche veränderlich. Periode 231^d.8. — *Schmidt* 1844. (A.)

Vergleichsterne.


ε Geminorum	3.21 ^m	5 ^c .9	G5
ξ	3.63	3.8	F5
δ	3.69	3.7	F

θ Geminorum	3.84 ^m	2 ^c .8	A5
υ	4.18	6.6	K5

14. Hercules.

1173. **RX** ($18^h 26^m 1^s + 2^s.78; + 12^0 32'.5 + 0'.04$).

Farbe 3, Spektrum A. Maximum $7^m.0$, Minimum $7^m.6$. Elemente:
Min. = 1912 Sept. 12 = $2419658^d.588 + 1^d.778574 \cdot E$. — *Sawyer* 1898. (D.)



Vergleichsterne.

a	$18^h 24^m 52^s$	$+ 13^0 47'.2$	$6^m.95$
b	$18 \ 27 \ 34$	$+ 13 \ 39.5$	$7 \ .10$
c	$18 \ 24 \ 22$	$+ 11 \ 35.0$	$7 \ .24$
d	$18 \ 26 \ 36$	$+ 13 \ 6.9$	$7 \ .90$
e	$18 \ 24 \ 53$	$+ 12 \ 23.4$	$8 \ .08$

953. **g** ($16^h 25^m 21^s + 1^s.97; + 42^0 6'.1 - 0'.13$).

Farbe 6.7, Spektrum Mb. Maximum 4.8—5.2. Minimum 5.3—6.0.
Unperiodischer Lichtwechsel. — *Baxendell* 1857. (A.)

1048. **u** ($17^h 13^m 38^s + 2^s.22; + 33^0 12'.5 - 0'.07$).

Farbe 2, Spektrum B3. Maximum 5^m , Minimum $5^m.6$. Elemente:
Hauptminimum = 1869 Mai 16 = $2403834^d.382 + 2^d.051027 \cdot E$. — *Schmidt* 1869. (D.) (Lichtkurve Fig. 77, Tafel III.)

1043. **α** ($17^h 10^m 5^s + 2^s.74; + 14^0 30'.2 - 0'.07$).

Farbe 7, Spektrum Mb. Maximum $3^m.0$, Minimum $3^m.8$. Unperiodischer
Lichtwechsel. — *W. Herschel* 1795. (A.)

Vergleichsterne.

α Ophiuchi	3.36 ^m	5° 5	K
δ Herculis	3.46	2 .5	A
η „	3.76	5 .1	K
ι Ophiuchi	4.56	2 .1	B8

15. Leo (Der Löwe.)

549. **R** ($9^h 42^m 11^s + 3^s.23; + 11^0 53'.6 - 0'.28$).


Farbe 9.5, Spektrum Md10. Maximum 5.0—6.5, Minimum 9.5—10.5.
Elemente: Maximum = 1800 Febr. 22 = $2378549^d.5 + 312^d.67 \cdot E + \text{Sinus-}$
glieder. — *Koch* 1782. (B.)

Vergleichsterne.

a	9 ^h 2.6 ^m	+ 10° 30'	4 ^m .66
b	9 54.9	+ 8 31	4 .89
c	9 26.5	+ 11 45	5 .19
d	9 52.8	+ 12 55	5 .45
e	9 38.3	+ 14 29	5 .64
f	9 41.0	+ 12 17	5 .84
g	9 30.5	+ 14 49	6 .12
h	9 42.0	+ 12 3	6 .43
k	9 45.4	+ 12 19	6 .62
l	9 38.2	+ 10 59	6 .88
m	9 44.5	+ 11 34	7 .23
n	9 42.1	+ 11 18	7 .47
o	9 42.3	+ 10 51	7 .67
p	9 45.6	+ 11 22	8 .02
q	9 43.6	+ 12 35	8 .21
r	9 43.4	+ 12 59	8 .41
s	9 39.6	+ 11 16	8 .65
t	9 44.2	+ 12 35	8 .85
u	9 41.8	+ 11 54	8 .98
w	9 43.5	+ 11 2	9 .14
x	9 43.0	+ 11 47	9 .68

y	9 ^h 41.9 ^m	+ 11° 51'	9 ^m .64
z	9 40.6	+ 11 58 10	.12
α	9 41.1	+ 11 47 10	.45
β	9 42.5	+ 11 38 10	.84

R Leonis.




16. Lepus. (Der Hase.)

228. R (4^h 55^m 3^s + 2^s.73; — 14° 57'.4 + 0'.09).

Farbe 10, Spektrum N. Maximum 6^m.0, Minimum 10^m.4. Elemente:
Max. = 1855 Okt. 22 = 2398 879^d + 436^d.4 · E. — Schmidt 1855. (B.) Maximum sehr flach und lang anhaltend.

R Leporis.



Vergleichsterne.

b	4 ^h 54 ^m 3 ^s	— 14° 55'.9	7 ^m .52
a	4 51 55	— 15 32.3	7 .85
b ¹	4 55 31	— 15 56.5	8 .50
c	4 54 49	— 15 53.7	8 .64
d	4 58 1	— 15 50.3	9 .00
f	4 55 18	— 15 31.3	9 .09
e	4 55 15	— 15 15.5	9 .47
g	4 56 9	— 14 58.6	10 .04
h	4 55 35	— 15 41.1	10 .24
k	4 54 9	— 15 20.2	10 .35
l	4 55 30	— 15 15.3	10 .63

17. Libra. (Die Wage.)

837. δ (14^h 55^m 38^s + 3^s.20; — 8° 7'.3 — 0'.24).

Farbe 0.5, Spektrum A. Maximum 5^m.1, Minimum 6^m.3. Elemente:
(Min. = 1867 Okt. 25 = 2403 265^d.380 + 2^d.3273 504 · E. — Schmidt 1859. (D.)
(Lichtkurve Fig. 83, Tafel III.)

18. Lyra. (Die Leier.)

1234. R ($18^h 52^m 17^s + 1^s.82; + 43^0 48'.8 + 0'.08$).

Farbe 7. Spektrum Mb. Maximum 4^m , Minimum $4^m.5$. Periode bisher nicht bestimmbar. Unregelmäßig? — *Baxendell* 1855. (Lichtkurve Fig. 78, Tafel III.)

Vergleichsterne.

a	$18^h 55^m 12^s$	$+ 32^0 33'.1$	$3^m.31$	e	$19^h 10^m 21^s$	$+ 38^0 58'.4$	$4^m.38$
b	$17 42 33$	$+ 27 46.7$	3.52	f	$18 51 0$	$+ 36 46.3$	4.50
c	$18 3 38$	$+ 28 44.9$	3.84	g	$19 12 54$	$+ 37 57.3$	4.54
d	$18 16 21$	$+ 36 1.2$	4.25	h	$18 58 37$	$+ 46 47.6$	5.02

1216. β ($18^h 46^m 23^s + 2^s.21; + 33^0 14'.8 + 0'.07$).

Farbe 3.9, Spektrum B2p. Maximum $3^m.4$, Minimum $4^m.1$. Elemente: Hauptmin. = 1855 Jan. 6 = $2398590^d.604 + 12^d.908006 \cdot E + 0^d.000003946 E^2$ — *Goodricke* 1784. (D.)

Vergleichsterne.

γ Lyrae	3.55 ^m	2° 9	A
μ Herculis	3.62	4.3	G5
ξ „	3.88	5.3	K
η Lyrae	4.68	2.0	B3



19. Monoceros. (Das Einhorn.)

388. T ($6^h 19^m 49^s + 3^s.24; + 7^0 8'.4 - 0'.03$).

Farbe 4.5, Spektrum G. Maximum $5^m.8$, Minimum $6^m.8$. Elemente: Max. = 1886 April 15 = $2410012^d.39 + 27^d.0100 \cdot E$ — *Davis* 1871. (C.) Die vermuteten Schwankungen der Lichtkurve bedürfen noch der Bestätigung.

Vergleichsterne.

a	$6^h 18^m 34^s$	$+ 8^0 56'.3$	$6^m.11$	e	$6^h 18^m 49^s$	$+ 7^0 56'.8$	$8^m.13$
b	$6 22 51$	$+ 6 1.0$	7.28	f	$6 18 52$	$+ 7 7.3$	8.54
c	$6 22 44$	$+ 5 59.1$	7.56	g	$6 20 36$	$+ 7 31.2$	8.76
d	$6 21 53$	$+ 6 34.4$	7.81	h	$6 18 35$	$+ 7 18.3$	9.02



450. U ($7^h 26^m 1^s + 2^s.86$; $-9^{\circ} 34'.0 - 0'.12$).

Farbe 4.5, Spektrum K. Maximum $6^m.2$, Minimum $7^m.0$. Elemente: Max. = 1883 März 2 = $2408872^d.0 + 46^d.13$. E. Typus R Scuti oder β Lyrae. — Gould 1873.

20. Ophiuchus. (Der Schlangenträger.)

1046. U ($17^h 11^m 27^s + 3^s.04$; $+1^{\circ} 19'.3 - 0'.07$).

Farbe 2, Spektrum B 8. Maximum $5^m.7$, Minimum $6^m.3$. Elemente: Min. = 1908 März 25 = $2418026^d.703 + 1^d.6773476$. E. Haupt- und Nebenminimum. — Gould 1871. (D.)

Vergleichsterne.


a	17^h	$0^m 23^s$	$-0^{\circ} 45'.3$	$5^m.62$	d	$17^h 11^m 13^s$	$+2^{\circ} 17'.8$	$6^m.05$
b	17	0 11	$+0 51.5$	5.92	e	17 1 39	$-1 30.4$	6.26
c	17	3 4	$-0 56.9$	6.02	f	17 12 35	$+1 51.8$	6.67

948. V ($16^h 21^m 10^s + 3^s.34$; $-12^{\circ} 12'.0 - 0'.14$).

Farbe 9.1, Spektrum N. Maximum 7^m , Minimum 10^m . Elemente: Max. = 1874 Mai 16 = $2405660^d + 302^d.5$. E. Periode abnehmend? — Dunér 1881. (B.)

Vergleichsterne.

a	$16^h 23^m 48^s$	$-13^{\circ} 21'.0$	$7^m.19$
b	16 18 41	$-11 39.6$	7.56
c	16 25 14	$-12 55.0$	8.12
d	16 20 48	$-11 15.3$	8.32
e	16 24 21	$-11 48.7$	8.43
f	16 22 27	$-12 52.3$	8.61
g	16 19 23	$-12 56.7$	8.96
h	16 25 6	$-12 53.8$	9.20
k	16 21 28	$-12 12.9$	9.63
l	16 20 57	$-12 22.2$	10.06
m	16 19 17	$-12 55.1$	10.48
n	16 19 52	$-12 42.0$	10.88




1182. X ($18^h 33^m 34^s + 2^s.87$; $+8^{\circ} 44'.8 + 0'.05$).

Farbe 9, Spektrum Md 8. Maximum $6^m.7$, Minimum $9^m.0$. Elemente: Max. = 1886 Juni 2 = $2410060^d + 335^d.2$. E. — Espin 1886. (B.)

Vergleichsterne.

a	18 ^h 28 ^m 34 ^s	+8° 12' 2"	6.50	h	18 ^h 33 ^m 3 ^s	+8° 27' 9"	9 ^m .46
b	18 35 59	+8 41 .6	7.10	k	18 33 45	+8 2.6	9.49
c	18 35 36	+8 46 .3	7.18	l	18 33 0	+8 21.5	9.56
d	18 34 46	+8 39 .1	7.31	m	18 35 8	+8 43.1	9.94
e	18 32 40	+9 10 .3	8.16	n	18 33 33	+8 38.1	10.05
f	18 36 31	+7 48 .8	8.22	o	18 33 55	+8 13.4	10.32
g	18 33 23	+9 43 .1	8.84	p	18 33 28	+8 47.0	10.37




1084. Y (17^h 47^m 17^s + 3^s.22; — 6° 7' 1" — 0'.02).

Farbe 3, Spektrum G. Maximum 6^m.0, Minimum 6^m.7. Elemente:
 Max. = 1882 Sept. 5 = 2408 694^d.25 + 17^d.1207 · E. — *Sawyer* 1888. (C.)
 (Lichtkurve Fig. 79, Tafel III.)


Vergleichsterne.

a	17 ^h 51 ^m 31 ^s	— 4° 4' 1"	5 ^m .60	d	17 ^h 57 ^m 27 ^s	— 5° 21' 8"	6 ^m .64
b	17 54 20	— 4 49 .0	5.98	e	17 47 18	— 5 14 .3	6.87
c	17 38 21	— 7 1 .3	6.20	f	17 47 53	— 5 54 .3	6.92

Y Ophiuchi



W Orionis



21. Orion.

231. W (5^h 0^m 14^s + 3^s.10; + 1° 2' 4" + 0'.09).

Farbe 8.5, Spektrum N. Maximum 5^m.8, Minimum 7^m.2. Unregelmäßig oder 11- bis 12jährige Periode. — *Backhouse* 1894. (A?)

353. U ($5^h 49^m 53^s + 3^s.56$; $+ 20^0 9'.5 + 0'.01$).

Farbe 8, Spektrum Md 9. Maximum 6.0—7.0, Minimum 11.0—12.0.
Elemente: Max. = 1885 Dez. 12 = $240988^d.5 + 373^d.4$. E. — Gore 1885. (B.)

Vergleichsterne.

a	$5^h 48.5^m$	$+ 20^0 16'$	$4^m.52$	l	$5^h 49.3^m$	$+ 19^0 40'$	$8^m.27$
b	5 58.0	$+ 20 \quad 8$	4 .82	m	5 50.0	$+ 20 \quad 6$	8 .88
c	5 57.6	$+ 19 \quad 41$	5 .28	n	5 50.5	$+ 20 \quad 4$	9 .00
d	5 49.1	$+ 19 \quad 44$	5 .80	o	5 51.4	$+ 20 \quad 15$	9 .36
e	5 46.5	$+ 19 \quad 50$	6 .01	p	5 50.4	$+ 20 \quad 9$	9 .66
f	5 47.4	$+ 20 \quad 17$	6 .62	q	5 50.0	$+ 20 \quad 9$	10 .18
g	5 46.0	$+ 19 \quad 30$	7 .04	r	5 49.8	$+ 20 \quad 4$	10 .56
h	5 46.6	$+ 19 \quad 43$	7 .61	s	5 50.3	$+ 19 \quad 58$	11 .05
k	5 49.1	$+ 19 \quad 35$	7 .94				


261. VV ($5^h 28^m 27^s + 3^s.04$; $- 1^0 13'.6 + 0'.05$).

Spektrum B 2. Maximum $5^m.2$, Minimum $5^m.6$. Elemente: Hauptmin. = 1913 März 8 = $2419835^d.27 + 1^d.4854$. E. — Hertzsprung 1913. β Lyrae-Typus. (D.)


47. BL ($6^h 19^m 46^s + 3^s.42$; $+ 14^0 46'.6 - 0'.03$).

Farbe 7.2, Spektrum N. Maximum $4^m.7$, Minimum $6^m.6$. Lichtwechsel wahrscheinlich unperiodisch. — Birmingham 1874.

VV Orionis



BL Orionis



352. α ($5^h 49^m 45^s + 3^s.25$; $+ 7^0 28'.3 + 0'.01$).

Farbe 7, Spektrum Ma. Maximum $0^m.5$, Minimum $1^m.1$. Der Lichtwechsel ist unperiodisch. — J. Herschel 1836. (A.)

22. Pegasus.


1565. TW ($21^h 59^m 27^s + 2^s.72; + 27^0 51'.8 + 0'.29$).

Farbe 7.1. Maximum $7^m.0$, Minimum $7^m.7$. Elemente: Max. = 1913 Sept. 17 = $2420028^d + 74^d$? Die Elemente sind noch recht unsicher. — *Leavitt* 1907. (C?)

23. Perseus.

167. X ($3^h 49^m 8^s + 3^s.74; + 30^0 45'.1 + 0'.18$).

Farbe 3.5, Spektrum F. Maximum $6^m.3$, Minimum $7^m.0$. Lichtwechsel unperiodisch. — *Müller u. Kempf* 1898. (A.) Der Lichtwechsel verläuft außerordentlich langsam bei geringer Helligkeitsschwankung. (Lichtkurve Fig. 80, Tafel III.)



99. SU ($2^h 15^m 5^s + 4^s.18; + 56^0 8'.8 + 0'.28$).

Farbe 7. Maximum $6^m.8$, Minimum $8^m.5$. Unperiodischer Lichtwechsel? — *Leavitt* 1907.

137. β ($3^h 1^m 40^s + 3^s.89; + 40^0 34'.2 + 0'.23$).

Farbe 2, Spektrum B 8. Maximum $2^m.4$, Minimum $3^m.5$. Elemente: Min. = 1888 Jan. 3 = $2410640^d.351 + 2^d.867310$. E, dazu 2 Sinusglieder. — *Montanari* 1667. (D.) (Lichtkurve Fig. 81, Tafel III.)

Vergleichsterne.

α Persei	$2^m.16$	$3^c.5$	F 5	δ Persei	$3^m.31$	$2^c.5$	B 5
γ Andromedae	2 .35	5 .4	K 0	α Trianguli	3 .64	4 .1	F 5
ϵ Persei	3 .14	2 .2	B 1	α Persei	3 .98	5 .8	K 0
ζ "	3 .17	4 .8	F 5	ν "	4 .00	3 .9	F 5

134. ϱ ($2^h 58^m 46^s + 3^s.82; + 38^0 27'.2 + 0'.24$).

Farbe 6.7, Spektrum M b. Maximum $3^m.3$, Minimum $4^m.1$. Unperiodischer Lichtwechsel. — *Schmidt* 1853. (A.) Die Lichtänderungen sind zuweilen sehr langsam und undeutlich, zuweilen so schroff, daß fast die ganze Schwankung von $0^m.08$ in einer Woche durchlaufen wird.

24. Sagitta. (Der Pfeil)

1366. S ($19^h 51^m 29^s + 2^s.73$; $+ 16^\circ 22'.2 + 0'.16$).

Farbe 4.0, Spektrum G. Maximum $5^m.4$, Minimum $6^m.1$. Elemente:
 Max. = 1885 Nov. 17 = $2409863^d.324 + 8^d.381613 \cdot E$. — Gore 1885. (C.)
 Einbiegungen in der Lichtkurve wahrscheinlich. (Vgl. Fig. 82, Tafel III.)

Vergleichsterne.


a	$19^h 53^m 13^s$	$+ 16^\circ 31'.2$	$5^m.36$
b	$19 \ 58 \ 55$	$+ 15 \ 45.0$	$5 \ 47$
c	$19 \ 55 \ 32$	$+ 17 \ 14.6$	$5 \ 54$
d	$19 \ 59 \ 37$	$+ 16 \ 47.9$	$5 \ 90$
e	$19 \ 47 \ 54$	$+ 18 \ 24.9$	$6 \ 24$
f	$19 \ 53 \ 43$	$+ 16 \ 13.2$	$6 \ 76$

1306. U ($19^h 14^m 26^s + 2^s.63$; $+ 19^\circ 25.7 + 0'.11$).

Farbe 2, Spektrum A. Maximum $6^m.8$, Minimum $9^m.3$. Elemente:
 Min. = 1901 Nov. 1 = $2415690^d.276 + 3^d.380603 \cdot E$. — Schwab 1901. (D.)

Vergleichsterne.

a	$19^h 10^m 42^s$	$+ 20^\circ 2'.1$	$6^m.12$	h	$19^h 16^m \ 8^s$	$+ 19^\circ 16'.6$	$8^m.44$
b	$19 \ 19 \ 26$	$+ 20 \ 4.1$	$6 \ 54$	k	$19 \ 13 \ 14$	$+ 18 \ 58.7$	$8 \ 48$
c	$19 \ 18 \ 52$	$+ 20 \ 4.8$	$7 \ 00$	l	$19 \ 15 \ 38$	$+ 19 \ 12.4$	$8 \ 64$
d	$19 \ 13 \ 26$	$+ 18 \ 40.0$	$7 \ 58$	m	$19 \ 13 \ 55$	$+ 19 \ 53.7$	$9 \ 45$
e	$19 \ 18 \ 49$	$+ 19 \ 11.2$	$7 \ 78$	n	$19 \ 14 \ 22$	$+ 19 \ 26.9$	$9 \ 62$
f	$19 \ 13 \ 38$	$+ 20 \ 1.3$	$8 \ 13$	o	$19 \ 13 \ 11$	$+ 19 \ 13.4$	$9 \ 82$
g	$19 \ 15 \ 4$	$+ 19 \ 32.3$	$8 \ 16$	p	$19 \ 15 \ 42$	$+ 19 \ 24.8$	$9 \ 84$




25. Sagittarius. (Der Schütze.)

1172. U ($18^h 26^m 0^s + 3^s.54$; $-19^\circ 11'.7 + 0'.04$).

Farbe 6.5, Spektrum F 5. Maximum $7^m.0$, Minimum $8^m.3$. Elemente:
Max. = 1870 Juli 1 = $2404245^d.0 + 6^d.7446$. E. — Schmidt 1866. (C.)

USagittarii 47



Vergleichsterne.

a	$18^h 25^m 27^s$	$-18^\circ 57'.8$	$6^m.94$
b	$18 \ 26 \ 37$	$-19 \ 2.6$	6.97
c	$18 \ 29 \ 29$	$-19 \ 20.5$	7.00
d	$18 \ 26 \ 20$	$-19 \ 11.6$	7.35
e	$18 \ 26 \ 34$	$-19 \ 31.7$	7.88
f	$18 \ 25 \ 45$	$-19 \ 9.0$	7.92
g	$18 \ 25 \ 30$	$-19 \ 13.6$	8.02
h	$18 \ 26 \ 37$	$-19 \ 21.5$	8.33
k	$18 \ 26 \ 19$	$-19 \ 20.7$	8.72

1146. Y ($18^h 15^m 30^s + 3^s.53$; $-18^\circ 54'.3 + 0'.02$.)

Farbe 0, Spektrum G. Maximum $5^m.7$, Minimum $6^m.6$. Elemente:
Max. = 1886 Sept. 25 = $2410175^d.10 + 5^d.7734$. E. — Sawye 1886. (C.)
(Lichtkurve Fig. 84, Tafel III.)

YSagittarii.



Vergleichsterne.

a	$18^h 19^m 24^s$	$-20^\circ 35'.7$	$4^m.94$
b	$18 \ 25 \ 35$	$-18 \ 28.3$	5.18
c	$18 \ 9 \ 15$	$-20 \ 45.5$	5.47
d	$18 \ 24 \ 19$	$-18 \ 47.5$	5.76
e	$18 \ 9 \ 39$	$-18 \ 41.1$	6.08

26. Serpens. (Die Schlange.)

1164. d ($18^h 22^m 6^s + 3^s.07$; $+0^\circ 8'.2 + 0'.03$).

Farbe 4, Spektrum A. Maximum $5^m.0$, Minimum $5^m.7$. Zweifelhaft,
ob unveränderlich oder unperiodisch. — Yendell 1894.


27. Scutum. (Der Schild.)

1206. R ($18^h 42^m 9^s + 3^s.21; -5^0 48'.7 + 0'.06$.)

Farbe 6,3, Spektrum Pec. Maximum 4.7—5.7, Minimum 6.9—9.0.
Lichtwechsel unperiodisch? — Pigott 1795. Dauer und Helligkeiten der
Maxima und Minima stark veränderlich. (Lichtkurve Fig. 85, Tafel III.)

Vergleichsterne.

a	$18^h 41'.9$	$-4^0 51'$	$4^m.50$	h	$18^h 41'.8$	$-6^0 0'$	$7^m.07$
b	$18 \ 36.8$	$-9 \ 9$	$4 \ .82$	k	$18 \ 47.4$	$-5 \ 57$	$7 \ .56$
c	$18 \ 51.7$	$-5 \ 58$	$4 \ .97$	l	$18 \ 38.1$	$-5 \ 48$	$7 \ .63$
d	$18 \ 38.1$	$-8 \ 23$	$5 \ .19$	m	$18 \ 40.7$	$-6 \ 22$	$8 \ .00$
e	$18 \ 57.6$	$-3 \ 51$	$5 \ .65$	n	$18 \ 39.8$	$-5 \ 37$	$8 \ .31$
f	$18 \ 44.3$	$-6 \ 1$	$6 \ .13$	o	$18 \ 40.7$	$-6 \ 26$	$8 \ .62$
g	$18 \ 43.3$	$-6 \ 7$	$6 \ .74$				



28. Taurus. (Der Stier.)

166. X ($3^h 47^m 50^s + 3^s.22; +7^0 28'.6 + 0'.18$.)

Spektrum F 2. Maximum $6^m.6$, Minimum $8^m.1$, Unperiodischer
Lichtwechsel. — Gould 1876. (A.)

172. λ ($3^h 55^m 8^s + 3^s.32; +12^0 12'.5 + 0'.17$.)

Farbe 2, Spektrum B 3. Maximum $3^m.8$, Minimum $4^m.2$. Elemente:
Min. = 1857 Okt. 19 = $2399607^d.527 + 3^d.952941 \cdot E$. Periode nicht
konstant. (D.)

Vergleichsterne.


π^3 Orionis	$3^m.50$	$4^e.0$	F 8
α Tauri	$3 \ .86$	$4 \ .9$	G 5
γ "	$3 \ .98$	$5 \ .2$	K 0
ξ "	$3 \ .94$	$2 \ .1$	B 8
δ "	$4 \ .16$	$5 \ .6$	K 0

29. Triangulum. (Das Dreieck.)

113. R ($2^h 30^m 59^s + 3^s.62$; $+ 33^{\circ} 49'.7 + 0'.26$.)

Farbe 7, Spektrum Md 7. Maximum $6^m.2$. Minimum $11^m.6$. Elemente: Max. = 1892 März 23 = $2412181^d + 265^d.4 \cdot E + 16^d \sin (12^{\circ}.9 E + 270^{\circ})$. — *Espin, Fleming* 1890. (B).

Vergleichsterne.





a	2 ^h 26 ^m 52 ^s	$+ 34^{\circ} 6'.1$	5 ^m .85
b	2 24 19	$+ 33 23.2$	6 .25
c	2 29 46	$+ 34 17.3$	6 .74
d	2 33 47	$+ 33 31.1$	7 .40
e	2 27 41	$+ 33 54.7$	7 .74
f	2 32 31	$+ 33 56.4$	8 .04
g	2 29 0	$+ 33 43.6$	8 .36
h	2 28 32	$+ 33 28.5$	8 .56
k	2 30 10	$+ 34 18.8$	9 .24
l	2 30 38	$+ 33 42.7$	9 .50
m	2 31 27	$+ 33 46.6$	9 .80
n	2 31 23	$+ 33 38.0$	10 .21
o	2 29 55	$+ 33 47.5$	10 .58
p	2 31 20	$+ 33 34.4$	10 .96
q	2 31 30	$+ 33 28.5$	11 .10

30. Ursa major. (Der große Bär.)

666. Z. ($11^h 51^m 17^s + 3^s.16$; $+ 58^{\circ} 25'.7, 7 - 0'.33$.)

Farbe 8, Spektrum Md. Maximum $6^m.8$, Minimum $8^m.7$. Große Unregelmäßigkeiten im Lichtwechsel. — *King* 1904. (B?)



649. ST ($11^h 22^m 23^s + 3^s.30; + 45^0 44'.2, - 0'.33.$)


Spektrum Mb. Maximum $6^m.7$, Minimum $7^m.8$. Art des Lichtwechsels unbekannt. — *Leavitt* 1907. (Lichtkurve Fig. 86, Tafel III.)

Vergleichsterne.

a	$11^h 22^m 30^s$	$+ 45^0 26'.2$	$6^m.77$
b	$11 \ 22 \ 31$	$+ 45 \ 7.3$	$6 \ .96$
c	$11 \ 16 \ 19$	$+ 45 \ 52.6$	$8 \ .12$
d	$11 \ 26 \ 11$	$+ 45 \ 22.2$	$8 \ .71$
e	$11 \ 23 \ 22$	$+ 45 \ 41.8$	$8 \ .96$

88. SY ($9^h 49^m 12^s + 3^s.94; + 50^0 17'.5 - 0'.28.$)

Maximum $5^m.2$, Minimum $6^m.3$. Elemente: Max. = $2419106^d + 257^d$. E.
— *Müller u. Kempf* 1914. (B.)



31. Virgo. (Die Jungfrau.)

706. R ($12^h 33^m 26^s + 3^s.05; + 7^0 32'.3 - 0'.33.$)

Farbe $2 \pm$, Spektrum Md 5. Maximum $6.5-8.0$, Minimum $9.7-11.0$.
Elemente: Max. = $1809 \text{ Juni } 0 = 2381934^d.8 + 145^d.47$. E + Sinusglieder.
Harding 1809: (B.)

Vergleichsterne.

a	$12^h 36^m.9$	$+ 7^0 22'$	$5^m.50$	k	$12^h 39^m.3$	$+ 7^0 25'$	$8^m.58$
b	$12 \ 26 \ .3$	$+ 8 \ 10$	$6 \ .04$	l	$12 \ 31 \ .8$	$+ 8 \ 29$	$8 \ .95$
c	$12 \ 32 \ .1$	$+ 9 \ 21$	$6 \ .49$	m	$12 \ 32 \ .3$	$+ 7 \ 24$	$9 \ .34$
d	$12 \ 29 \ .4$	$+ 8 \ 17$	$6 \ .87$	n	$12 \ 34 \ .6$	$+ 7 \ 37$	$9 \ .62$
e	$12 \ 28 \ .5$	$+ 8 \ 13$	$7 \ .09$	o	$12 \ 36 \ .8$	$+ 7 \ 35$	$9 \ .89$
f	$12 \ 28 \ .4$	$+ 8 \ 30$	$7 \ .56$	p	$12 \ 32 \ .9$	$+ 7 \ 43$	$10 \ .21$
g	$12 \ 35 \ .5$	$+ 8 \ 15$	$7 \ .88$	q	$12 \ 30 \ .7$	$+ 7 \ 20$	$10 \ .59$
h	$12 \ 38 \ .8$	$+ 8 \ 7$	$8 \ .20$	r	$12 \ 31 \ .9$	$+ 7 \ 18$	$10 \ .98$

32. Vulpecula. (Das Füchsen.)

1464. T ($20^h 47^m 13^s + 2^s.55; + 27^0 52'.5 + 0.22.$)


Farbe 0, Spektrum F. Maximum $5^m.5$, Minimum $6^m.4$. Elemente:
Max. = 1885 Nov. 3 = $2409849^d.058 + 4^d.435521$ E. — *Sawyer* 1885. (C.)
(Lichtkurve Fig. 87, Tafel III.)

Vergleichsterne.

ϵ	$20^h 47^m 51^s$	$+ 26^0 43'.3$	$4^m.74$
ι	20 50 18	$+ 27^0 40.6$	5 .25
σ	20 32 49	$+ 26^0 6.8$	5 .56
δ	20 37 0	$+ 31^0 57.1$	5 .74
e	20 50 7	$+ 28^0 8.4$	6 .44

1333. U ($19^h 32^m 15^s + 2^s.62; + 20^0 6'.6 + 0'.13.$)

Farbe 6.4, Spektrum K 5. Maximum $6^m.9$, Minimum $7^m.6$. Elemente:
Max. = 1897 Okt. 2 = $2414200^d.253 + 7^d.98950.0$ E. — *Müller u. Kempf*
1896. (C.) (Lichtkurve Fig. 88, Tafel III.)



Vergleichsterne.

a	$19^h 33^m 57^s$	$+ 20^0 33'.5$	$6^m.50$
b	19 27 43	$+ 20^0 43.8$	6 .96
c	19 28 56	$+ 20^0 11.9$	7 .31
d	19 35 13	$+ 21^0 6.4$	7 .35
e	19 32 25	$+ 19^0 14.1$	7 .89
f	19 35 18	$+ 20^0 33.1$	8 .06

B. Jährliche Präzession in Deklination.

AR		Präz.	AR		AR		Präz.	AR	
h	m	"	h	m	h	m	"	h	m
0	0	+ 20,1	24	0	12	0	- 20,1	12	0
0	20	+ 20,0	23	40	11	40	- 20,0	12	20
0	40	+ 19,7	23	20	11	20	- 19,7	12	40
1	0	+ 19,4	23	0	11	0	- 19,4	13	0
1	20	+ 18,8	22	40	10	40	- 18,8	13	20
1	40	+ 18,2	22	20	10	20	- 18,2	13	40
2	0	+ 17,4	22	0	10	0	- 17,4	14	0
2	20	+ 16,4	21	40	9	40	- 16,4	14	20
2	40	+ 15,4	21	20	9	20	- 15,4	14	40
3	0	+ 14,2	21	0	9	0	- 14,2	15	0
3	20	+ 12,9	20	40	8	40	- 12,9	15	20
3	40	+ 11,5	20	20	8	20	- 11,5	15	40
4	0	+ 10,0	20	0	8	0	- 10,0	16	0
4	20	+ 8,5	19	40	7	40	- 8,5	16	20
4	40	+ 6,9	19	20	7	20	- 6,9	16	40
5	0	+ 5,2	19	0	7	0	- 5,2	17	0
5	20	+ 3,5	18	40	6	40	- 3,5	17	20
5	40	+ 1,7	18	20	6	20	- 1,7	17	40
6	0	+ 0,0	18	0	6	0	- 0,0	18	0

Die Anlage der Tafeln folgt aus der Theorie der Präzession; dort wird gezeigt, daß die Änderung der Rektaszension (AR) von beiden Koordinaten des Sternes abhängt, die Änderung der Deklination aber nur von seiner Rektaszension. Infolgedessen hat man bei der ersten Tafel mit den Argumenten α und δ einzugehen, bei der zweiten Tafel dagegen nur mit α . Die doppelten Rektaszensionsreihen in den Tafeln rühren daher, daß immer derselbe Präzessionsbetrag zu zwei verschiedenen Rektaszensionen gehört. In der oberen Tafel sind die beiden α -Reihen auf der rechten Seite bei negativen Deklinationen zu benutzen. Der Präzessionsbetrag ist in dieser Tafel positiv, wo nicht ausdrücklich das Gegenteil bemerkt ist.

Beispiel: Der Stern α *Ursae majoris* hatte 1900,0 die Rektaszension $10^h 57^m,6$ und die Deklination $+62^\circ 17'$. Welches ist der Ort des Sternes für 1940,0? Man hat zunächst für $\alpha = 10^h 40^m$ und $\alpha = 11^h 20^m$ in $+60^\circ$ Deklination die Präzessionsbeträge $+3^s,9$ bzw. $3^s,5$, so daß man, da die gegebene Rektaszension ungefähr in der Mitte zwischen $10^h 40^m$ und $11^h 20^m$ liegt, den Wert $3^s,7$ als gültig annehmen wird. Ferner erhält man für $\alpha = 10^h 40^m$ und $\alpha = 11^h 20^m$ in $+70^\circ$ Deklination die Beträge $4^s,3$ und $3^s,7$, woraus auf Grund derselben Überlegung wie eben für unser Beispiel der Wert $4^s,0$ folgt. Die gegebene Rektaszension

liefert also für $+60^{\circ}$ Deklination den Präzessionswert $3^{\circ},7$, für $+70^{\circ}$ den Wert $+4^{\circ},0$; somit beträgt der Unterschied für 10° Deklination $0^{\circ},3$, für 2° nur $0^{\circ},06$ oder abgerundet $0^{\circ},1$. Die jährliche Änderung der Rektaszension findet man also zu $3^{\circ},7 + 0^{\circ},1 = 3^{\circ},8$. In 40 Jahren ergibt das einen Zuwachs von $40 \cdot 3^{\circ},8 = 152^{\circ} = 1^{\text{m}} 32^{\text{s}}$, addiert man diesen Betrag zu $10^{\text{h}} 57^{\text{m}},6$, so folgt $\alpha_{1940} = 10^{\text{h}} 59^{\text{m}},1$.

Als jährliche Änderung in Deklination gibt unsere Tafel für $\alpha = 10^{\text{h}} 57^{\text{m}}$ rd. $-19'',3$; damit wird die Änderung in 40 Jahren $-19''3 \cdot 40 = -772'' = -12',9$, also $\delta_{1940} = +62^{\circ} 17' - 12',9 = 62^{\circ} 4'$.

Sollen Rektaszension und Deklination für die um 40 Jahre vor 1900 liegende Epoche 1860,0 berechnet werden, so sind die ermittelten Präzessionsbeträge natürlich mit entgegengesetztem Vorzeichen anzubringen.

2. Die gebräuchlichsten Sternnamen.

Aldebaran	α Tauri	Castor	α Geminorum	Praesepe	ε Cancrī
Algol	β Persei	Deneb	α Cygni	Procyon	α Canis min.
Alcyone	η Tauri	Denebola	β Leonis	Regulus	α Leonis
Antares	α Scorpii	Fomalhaut	α Piscis austr.	Rigel	β Orionis
Arcturus	α Bootis	Gemma	α Coronae	Sirius	α Canis maj.
Atair	α Aquilae	Mira	$\circ$ Ceti	Spica	α Virginis
Bellatrix	γ Orionis	Mizar	ζ Ursae maj.	Wega	α Lyrae
Beteigeuze	α Orionis	Polaris	α Ursae min.		
Capella	α Aurigae	Pollux	β Geminorum		

FERD. DÜMMLERS VERLAG

Gegründet 1808 BERLIN SW 68 Postscheck 145

Sternatlas. Nach der 4. Auflage von Littrows Atlas des gestirnten Himmels vollständig neu bearbeitet von Friedrich Becker.
Geb. GM. 8.—

„Der Sternatlas ist in solchem Umfang umgearbeitet und verbessert worden, daß er als Neuschöpfung gelten kann: . . . Alle Freunde der Astronomie werden dem Herausgeber dankbar sein, daß dieser Sternatlas in so vervollkommneter und schöner Weise wieder erschienen ist.“
(Literar. Handweiser.)

Littrows Atlas des gestirnten Himmels. Für Freunde der Astronomie.
Taschenausgabe, 3. Auflage. Geb. GM. 2.—

„Hevelius“, Handbuch für Freunde der Astronomie und kosm. Physik. In Verbindung mit Friedrich Albrecht, Friedrich Becker, Theobald Epstein, Philipp Fauth, Johannes Hellerich, Cuno Hoffmeister, Christian Jensen, Otto Knopf, Hans Kolbow, Martin Lindow, Heinrich Osthoff und Ernst Schultz herausgegeben von Joseph Plassmann. Gr. 8° (XIX und 672 S., reich illustriert.) GM. 12.—, geb. 15.—

„Den zahlreichen Freunden der Himmelskunde wird hier ein allen modernsten Ansprüchen genügendes umfassendes Handbuch dargeboten: Die mathematischen Grundlagen der astronomischen Berechnungen und diese selbst, die Beobachtungen der Gestirne, die Astrospektroskopie, die Einrichtung der Sternwarten, die astronomischen Instrumente inkl. der geometrischen Optik, die Zeitmessung, die Himmelsphotographie, Finsternisse, veränderliche Sterne, dazu die Übersicht über das gesamte Gebiet der Geophysik, nichts Einschlägiges ist vergessen. So vermag das eine Buch eine kleine astronomische Bibliothek zu ersetzen. Der Name Plassmann bürgt für die Hochwertigkeit des Inhalts.“
(Natur und Kultur.)

„Ein grandioses Werk, eine der bedeutendsten Erscheinungen unserer Literatur in schöner Ausstattung!“
(Literar. Handweiser.)












Die Freude an der Astronomie. Von Prof. W. Förster. 2. Auflage. GM. —.30.











Kleine Himmelskunde. Versuch einer gemeinfaßlichen Darstellung des Wissenswertesten aus der Astronomie. Mit vielen Abbildungen. Von Prof. Dr. Joseph Plassmann. (Im Druck)













Littrows Wunder des Himmels. 9. Auflage, bearbeitet von Prof. Dr. Paul Guthnick, Direktor der Sternwarte Berlin-Babelsberg. (In Vorbereitung, erscheint 1924.)

Die Himmelswelt. Mitteilungen der „Vereinigung von Freunden der Astronomie und kosmischen Physik“ (V. A. P.), redigiert von Prof. Dr. J. Plassmann. 34. Jahrgang 1924. (Zirka 12 Hefte.) GM. 6.—, Ausland: Schweizer Fr. 7.50,

Die „Vereinigung von Freunden der Astronomie und kosmischen Physik“ ladet Freunde der Himmelskunde zum Beitritt ein. Näheres und Probehefte durch den Verlag.







213305

Astron.
B.

Author Becker, Friedrich

Title Am Fernrohr.

University of Toronto
Library

DO NOT
REMOVE
THE
CARD
FROM
THIS
POCKET

Acme Library Card Pocket
Under Pat "Ref. Index File"
Made by LIBRARY BUREAU

